

類

證

治

裁

類證治裁卷之七

丹陽林珮琴義桐甫著

男

葉林叔

腸鳴論治

腸虛則鳴。寒氣相搏。或火激其水。腸亦鳴。經曰。中氣不足。腸爲之

苦鳴。宜六君子湯加炙。又曰。脾虛則腹滿。腸鳴。飧泄。食不化。香砂

子湯加。又曰。腸中雷鳴。上衝胸。邪在大腸。半夏瀉。又曰。土鬱之發。

腸鳴而爲數後。平胃散加茯苓。半夏。夏木香。又曰。熱淫所勝。病腹中腸鳴。氣上衝。

胸。葶藶。木香散。如臟寒有水。理中湯加桂枝。車前。胃寒洩瀉。智半。下氣暫止復鳴。

益中。火激動其水。二陳湯加苓。連。山梔。

氣虛升舉殄泄胸痞土鬱熱淫藏寒泄瀉下氣

附方

六君子湯

見一卷中風

補中益氣湯

見一卷中風

香砂六君子湯

六君子湯加

木香

砂仁

半夏瀉心湯

見一卷溫

平胃散

朮

樸

陳

草

葶藶木香散

二苓
木香

朮

澤

桂

爲五苓散再加

葶藶

理中湯

參

朮

薑

草

智半湯

益智仁
朮

半夏各五分
苓各一錢

加

葶煎

蒼朮四錢

防風二錢

益中湯

參

朮

苓

連

薑

枳

草

動痰

二陳湯

陳

夏


苓

草

類證治裁

卷之七

陽鳴



小大腸癰論治

小腸在臍之左。關元穴患癰則左腿不能伸。大腸在臍之右。天樞穴屬

大腸患癰則右腿不能伸。部位雖分爲病相似。治亦畧同。故金匱千

金概名腸癰也。其症小腹痞腫。按之痛。小便數似淋。發熱時自汗

出。復惡寒。身皮甲錯。腹皮急如腫狀。脉遲緊者。膿未成。可下之。桃

承氣湯。脉洪數者。膿已成。大黃牡丹湯膿從瘡出。或有出臍者。惟大便下

膿血者。自愈。按小便數似淋。或小便出膿血者。爲小腸癰。大便出

膿血者。爲大腸癰。膿從臍中出者。爲盤腸癰。多不治。此症總因濕

毒瘀血結滯腸內而成。其始發熱惡寒。小腹滿痛。反側不便。或腿

縮難伸。卽腸癰確候。其腹皮急。按之濡。不煩渴者。屬陰寒。牡丹散

內托十

宜其小腹痞堅。按之痛而煩熱者，屬結熱。大黃牡丹湯。或脈遲緊，則膿尚未成，急解毒。通腸飲，或大黃煎。若脈滑數，則膿已成，宜排膿。太乙膏，排膿散。如脈洪數，小腹脹痛，不食溺瀉，為膿壅滯，宜疏通。薏苡仁湯，排之。有瘀血，小腹硬痛。四物延胡湯。若腹濡痛，時下膿，由元氣虛，宜排膿藥中兼補益。丹皮散。或潰後痛甚，淋膿不止，由氣血大虧，須峻補。參耆地黃湯。凡患腸癰者，不可驚驚，則腸斷而死。坐臥轉側，宜徐緩，飲食不宜過飽，庶可保生。

腸癰脈候

腸癰之脈滑而數，滑則為實，數則為熱。滑則為營，數則為衛。衛數下降，營滑上升，營衛相干，血為敗濁。經脈。關內逢乳，腸裏癰。脈訣。

附方

桃仁承氣湯 見一卷痰

未膿成

大黃牡丹湯 大黃 芒硝各一錢半 枳實 丹皮 桃仁 各二錢半 一方有冬瓜仁 服下有膿即出

無即下血

寒症

牡丹皮散 參 耆 苓 丹 薤 芷 歸 芎 天麻 桃仁各一錢 官桂 甘草各五分 木香三分

寒症

內托十宣散 參 耆 歸 芎 防 芷 桔 樸 桂 忍冬藤 為末調以酒下三錢

未成

通腸飲 忍冬藤 歸尾 角刺 花粉 乳 沒 芷 薤 草 或用黃占礬為丸

未成

大黃煎 大黃 樸硝各一錢 丹皮 白芥子 桃仁各二錢 下後以參耆補托

已成

太乙膏 見六卷胃脘痛

後潰

排膿散 耆 歸 防 芷 薤 草 銀花 甲片各一錢

癰 滯 血 瘀 峻 補

薏苡仁湯 薏仁

薏仁各三錢

丹皮

桃仁各三錢

四物延胡湯

當歸 桃仁

延胡各一錢

芍

芍

生地各五分

紅花

牛膝各七分

水煎

參耆地黃湯

參 耆

耆

苓

地

丹

黃肉

山藥

薑

腸瘕

李氏寒熱脉數少腹左偏痛引內癰數日一更衣左足不伸此小腸瘕也蓋小腸火腑由氣血壅滯經隧發爲瘕毒宜先徹其在裏瘀熱則痛勢緩而瘕內消用大黃三錢硝石一錢歸尾半錢赤芍二錢桃仁一錢數服痛減次用乳香甘草節金銀花連翹當歸木瓜薏米牛膝數服而消

疝氣論治

疝氣者。小腹墜痛。控引羣丸。見症於肝。而原於任脉。故經謂任脉
為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。任起中極之下。上毛際。循腹
裏上關元。故疝為任病。瘕聚
即婦人經言七疝。衝狐厥癰瘕瘰癧也。經云。從少腹上衝心而痛。
不得前後為衝疝。言氣上衝心。二便不通。能上而不能下。木香
散。又
云。肝所生病為狐疝。言卧則入腹。立則入囊。仲景用蜘蛛散。
後人用二香丸。又云。
黃脉土之至也。大而虛。積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。言脾受肝
克。氣逆上升。實鑑當歸四
逆湯苦楝散。又云。三陽為病。發寒熱。其傳為癰疝。言
小腸膀胱之邪。傳為癰疝。囊丸腫大如棗。栳頑痺不仁。三層茴香
丸。荔枝散。
又云。脾傳之腎。病名疝瘕。少腹寬熱而痛。出白。言脾失運化而傳

於所勝。則瘕聚成形。痛出白淫。烏頭梔子湯加又云足陽明之筋

病瘕。疝腹筋急。又云肝脉滑甚為瘕。疝言肝木乘胃。或至潰膿下

血。荔枝核散。又云腎脉滑甚為瘕。瘕。又云厥陰之陰盛脉脹不通。

為瘕。瘕。疝言內裏膿血外小便閉。加味通此內經所謂七疝也。金

匱論疝皆主寒。至巢氏分厥。厥逆。癥氣積。食冷。腹痛。氣乍滿。臍旁

疝。臍下。腹大。便難。七疝。張子和非之。別列寒水筋。血氣。狐癰。七

種。謂諸疝不離乎肝。以肝脉絡陰器故也。其曰寒疝。囊冷如石。陰

莖不舉。實鑑當歸。水疝。囊如水晶。濕癢出水。加味五苓散。去筋。疝

莖痛筋急。或挺縱不收。龍膽瀉。血疝。狀如黃瓜。在小腹兩旁。復元

散。氣疝。止連腎下及囊。因怒氣脹。氣疝。飲。狐疝。癰疝。治同。丹溪云。自

素問而下。皆以疝爲經絡有寒。收引則痛。不知始由濕熱壅遏在
經。又感外寒。濕熱被鬱。不得疏散。故痛。蓋醉飽則火起於胃。房勞
則火起於腎。大怒則火起於肝。大勞則火起於筋。火鬱濕生。濁液
凝聚。逆入血隧。流於厥陰。肝性急速。爲寒所束。宜其痛矣。宜枳實
梔子黃連山若濕勝成癰。疝加荔枝核痛甚。加鹽炒大茴香痛處可按。加桂士材論
寒則多痛。熱則多癰。濕則腫墜。虛亦腫墜。在血分者不移。在氣分
者多動。皆足補前人所未備。今按疝症初起。必由虛寒勞力致之。
積久。腑絡阻痺。遂聚濕熱。用藥不離辛泄苦降。以肝司疏洩也。其
觸寒驟痛。兼犯生冷。用荔香散若火注陰分。而爲熱痛。必有熱症。熱脉
或便閉渴煩。宜大分清飲若食積疝痛。近臍必有塊梗起。立效散瘀血疝

痛在腹必有形不移。金鈴子散加桃仁五靈脂。因怒動肝脇脹必墜入腹。宜木

皮山梔香附。舉重傷力氣虛必下穿囊。舉元煎。火腑留邪內行苦

洩。胃苓湯加枳。腎囊流濕外用湯熏。以蛇床子川椒熟藥煎湯熏

小茴未拌勻。絹袋盛。氣聚絡虛理須疏導。宜延胡山甲木香歸

安腎囊下。冷則易之。虛濁逆法在溫通。宜乾薑吳黃荻房勞疝發溫攝下元。宜杞子沙

子茯苓鹿角。筋結疝癰治同木腎。宜穿山甲全蠍木瓜莖蘼荻荅

少腹偏墜散結為先。香橘散加穿山甲或穿陰丸腫大逐濕可效。

荔枝核十枚煨研。別有小腸氣名曰氣瘕痛引腰臍。天台烏膀胱

火酒調如糊服效。氣名曰水瀆不得小便。加味五又如奔豚響疝是氣水衝突下焦。

丹溪用理中湯去朮加桂心茯苓。或一捏金散或木通川棟各一

錢茴香五分飛鹽酒調服。丹溪云桂能泄奔豚茯苓能伐腎邪。

若白朮則助土克水。丸癩兒疳。舉丸。由啼哭動傷陰器。導氣湯或

燥腎閉氣故宜去之。錢核桃肉一兩。蜜。大約疝氣上攻者。宜吳黃桂心枳。下墜者。宜川

丸彈子大。日一丸。香附。橘核。木。按之大痛者為實。宜查肉。延胡。青皮。不痛者為虛。宜

香。葫蘆。巴等。按之大痛者為實。宜查肉。延胡。青皮。不痛者為虛。宜

芥。歸。杞。非。痛處寒者必寒積。宜川烏。胡椒。官桂。痛處熱者必濕熱。

子。核。桃。等。痛處寒者必寒積。宜川烏。胡椒。官桂。痛處熱者必濕熱。

宜山梔。川棟。木通。茯苓。莖縮者宗筋受寒。宜虎潛丸。去知藥。或鹿

橘核。蒼朮。厚樸。黃蘗等。莖縮者宗筋受寒。宜虎潛丸。去知藥。或鹿

等。莖縮者宗筋受寒。宜虎潛丸。去知藥。或鹿

等。莖縮者宗筋受寒。宜虎潛丸。去知藥。或鹿

等。莖縮者宗筋受寒。宜虎潛丸。去知藥。或鹿

等。莖縮者宗筋受寒。宜虎潛丸。去知藥。或鹿

丹溪云。不痛斷房事及厚味。不可治。信夫。

疝氣脉候

心脉搏滑急為心疝。肺脉沈搏為肺疝。腎脉肝脉大急沈皆為疝。
肝脉滑甚為癰疝。心脉微滑為心疝。腎脉滑甚為癰疝。脉急者曰疝。瘕小腹_內痛。經疝瘕積聚。脉弦急者生。虛弦小者死。經寸口脉弦而緊。弦緊相搏。則為寒疝。正傳脉弦急搏皆疝。弦數宜清熱。弦緊宜溫經。兼浮宜汗。兼實宜下。弦細為寒濕。弦濡為濕熱。醫通。

附方

衝痛 狐痛 疝痛
木香散 木香 陳皮 良薑 訶子 乾薑 枳實各一錢
半 草豆蔻 黑牽牛 川芎各一錢 水煎
蜘蛛散 蜘蛛十四枚微炒 桂心五分為末 每服一錢 白湯下

狐疝

二香丸 木香 香附各三兩 查肉二兩 三稜 蓬莪朮 醋炒 薑黃 南星各一兩 黃連炒 吳萸 橘

核 桃仁 山梔各五錢 薑汁糊丸

疝厥

寶鑑當歸四逆湯 歸尾七分 附子 官桂 茴香 柴胡 各五分 白芍四分 延胡 川棟子

茯苓各三分 澤瀉二分 水煎

疝厥 疝厥

苦棟散 木香 川棟子 巴豆 拌炒去巴豆 茴香 鹽炒 等 分爲末 每服二錢 酒調下

蟠葱散 蒼朮 甘草各一錢 三稜 義朮 茯苓 青皮 各七分 丁香 砂仁 檳榔各五分 延胡 肉

桂 乾薑各三分 其爲末 加葱白乙莖煎

疝厥

三層茴香丸 大茴香 鹽拌炒 川棟子 去核炒 沙參 木 香各一兩 爲末 水黃米糊丸 桐子大 每服三

錢空 心鹽湯下 日三服 服完接服第二層 此名第一層 第 二層 前方加 草撥一兩 檳榔五錢 丸法如前 再不愈 接服第三層 第三層即前二方加入 茯苓四兩 川附

一兩 丸法如前 此方雖數十年之久 陰囊腫人如升 如斗

癩痢

甚者大如栲栳服之皆可除根

荔枝散

荔枝核十四枚燒灰青鹽食鹽各一兩

沈香

大茴香炒

木香

酒調下

癩痢

細痛丸

延胡一兩

川棟肉

茴香各五錢

白丑頭末

全

蠟七个

薑汁糊丸

燒棉灰調酒送下

癩痢

烏頭梔子湯

川烏頭炮

梔子炒各三錢

水三鍾煎服

癩痢

荔枝橘核湯

荔枝枳草

橘核

桃仁

山查

延胡

苓

朮

癩痢

橘核丸

見三卷肝火

癩痢

加味通心散

瞿麥

木通

山查

等分爲末

枳

草

川棟

癩痢

加味五苓散

猪苓

茯苓

白朮各一兩

爲末每服四錢

加鹽

煎

苗

水疝筋疝血疝氣疝熱疝食積瘀血氣虛濕熱

八分 水煎
日三服

腎氣丸 見二卷虛損

龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

復元通氣散 見六卷心痛

氣疝飲 黃連二錢用吳茱萸煎水浸炒 人參 白朮各一錢 白芍 陳皮各七分 甘草三分 薑三片

大分清飲 見四卷泄瀉

立效散 見六卷腹痛

金鈴子散 見三卷鬱

舉元煎 見三卷飲食

胃苓湯 見一卷中風

偏墜小腸氣

香橘散

見六卷腹痛

天台烏藥散

川楝子十个巴豆同炒
良薑 青皮各五錢

烏藥
檳榔三

木香

茴香

良薑 青皮各五錢

檳榔三錢

爲末每服

酒一錢下

理中湯

見一卷中風

一、捏金

延胡川棟肉
錢酒下

全蠟

茴香

等分研末每服二

導氣湯

見三卷積聚

虎潛丸

見一卷中風

疝腎縮莖癰兒脈奔脈奔

酒煮當歸丸

當歸 附子炮
去皮核五錢

茴香各一兩

川棟子酒煮

入丁香

木香各三錢

上四味
延胡一兩

酒三升煮酒
全蠟十四个

爲末

酒
糖
丸

酒下

聚香飲

乳香
薑黃

烏沈香

檀香 桔梗

藿香
肉桂

朱香 甘草

丁香各八分
延胡各四分

分氣

薑黃

烏藥

桔梗

肉桂

甘草

延胡各四分

久痼

薑三片
棗二枚
香棟散

石菖蒲
末二錢

青木香
入麝香少許

荔枝核
茴香鹽炒研末

草薢
同熱酒

服
沖調

疝氣

李 疝病不離乎肝然經謂任脉爲病男子內結七疝女子帶下
瘕聚皆奇經主之宿病不理奇脉病結不解今觸寒輒發動氣
有聲痛引臍丸宜導滯通絡做茴香丸小茴橘核葫蘆巴延胡
炒俱酒當歸鹿角膠和丸酒下效

王 由吞酸傳爲少腹偏墜囊腫丸痛夫酸爲肝鬱氣注下爲疝
皆濕熱之邪經云邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛以肝脉
絡陰器也子和治疝用金鈴子散泄肝導逆與此頗符用吳茱
萸川楝子橘核茯苓青皮延胡青葱管木通數服而安

趙 疝發自下衝上猝痛下引臍丸此七疝中衝疝也經言督脉

生病從小腹上衝心而痛不得前後為衝疝用山梔川棟子去核

酒炒荔枝核橘核延胡俱酒焙當歸赤芍降香夫暴疝多寒久疝多

熱導熱疏滯腫痛自已

王 腹左偏墜舉丸腫痛腹息畧定乃舉重勞力所致蓋肝脉絡

陰器絡虛努掙氣穿入囊延久則成筋疝古人治疝必用辛香

流動之品以肝得疏泄其痛乃緩服藥兼宜節勞香附鹽製升麻

小茴香橘核延胡酒焙絲瓜筋薏米長流水煎二服愈

呂 因勞偏墜脉軟弱少年宿疴補以升之潞參三錢鹿角霜炙黃

耆當歸杜仲熟地杞子焙各二錢升麻六分橘核酒炒續斷各錢半薑棗煎

十服效

淋濁論治

腎有兩竅。一溺竅。一精竅。淋出溺竅。病在肝脾。濁出精竅。病在心

腎。同門異路。分別宜詳。內經論淋。由於脾濕鬱熱。病源謂腎虛則

小便數。膀胱熱則水下。滴數而且澇。則淋。澀引痛。凡小腸有氣。則

血。則小便澇。小腸有熱。則小便痛。症有五。石淋、勞淋、血淋、氣淋、膏淋也。石淋係膀

胱蓄熱。溺則莖中急痛。頻下沙石。如湯瓶久受煎熬。底結白碱也。

宜清其積熱。滌去沙石。水道自利。神效琥珀石淋初起。宜石琥珀

木通。或加蓋重。則為石。輕則為沙。二神勞淋有二。因思慮煩擾。負

重。遠行勞於脾者。補中湯加車前澤瀉。專因思慮者。歸脾因強力入房。勞於

腎者。生地黄丸加麥冬五味子。老人精衰入房。溺澇腹脹。牽引穀道者。腎氣血

淋熱甚搏血。失其常道。以心主血。與小腸為表裏。血滲胞中。與澳俱下。須辨血瘀。血虛。血熱。血冷。如小腹堅莖痛。脉沈弦而數者。為血瘀。雞蘇散。或四物湯。脉虛弱者。為血虛。六味丸。加側柏葉。車前子。白芍。八珍湯。送益元散。如血色鮮紅。脉數有力。心與小腸實熱也。大分清飲。加生地。黃芩。龍膽草。如血色黯淡。面枯白。尺脉沈遲者。腎與膀胱虛冷。腎氣湯。血淋小腸熱甚者。牛膝。山梔。生地。犀角。藕節。車前子。血虛熱者。生地三兩。黃芩。阿膠。各五錢。柏葉少許。血淋莖中痛。淡秋石宜之。或服薏苡根。氣淋。氣化不及。州都胞中。氣脹。少腹滿。或日用黃蘗絲煮湯服。痛溺有餘瀝。沈香散。如氣虛。加八珍湯。倍茯苓。氣虛下陷。補中膏。淋。瞿麥湯。如氣虛。加杜仲。牛膝。便有脂膩如膏。浮於凝。而此腎虛不能約制脂液而下流也。海金沙。鹿角霜丸。兔絲子丸。犬沈香丸。膏淋。溺不痛者。須固精。六味合。有熱淋。莖中痛者。

導赤散加

滑石燈心

聖不痛而癢者

人味丸去附子

溺艱澇如淋不作痛為虛

六味加鹿

其肉

從蓉

老人氣虛成淋

補中益氣湯

又有寒客下焦水道不快先寒戰而

後溲便由冷氣與正氣爭則寒戰成淋正氣勝則戰解得便是為

冷淋

腎氣丸肉從蓉丸

有過服金石入房太甚敗精癰隧而成淋者

海金沙散

有濕痰滲注而成淋者

湯

有淋而小腹脹甚者滑利通陽

莊白汁小

黃桂枝歸尾兩頭尖牛膝

婦人產後成諸淋者

白茅湯不論石膏淋皆治

以上淋症治法此

外有風寒濕客於胞中氣不能化胞滿而水道不通按之內痛而

滑者為胞痺

腎著湯腎瀝湯

亦溺竅病也至赤白濁由心動於慾腎傷於

色強忍不洩敗精流溢竅端時有穢物如瘡之膿如眼之眵淋瀝

不斷由精敗而腐居多亦有濕熱流注而成者須分便濁精濁濁

在便者色白如泔。乃濕熱內蘊。由過食肥甘辛熱炙烤所致。二苓丸

煎或徒薪飲。濁在精者。相火妄動。或逆精使然。至精溺並出。牛膝赤苓黃蘗遠志

細生甘草。或血不及變精。乃為赤濁。遠志丸加味清心飲。當分精瘀精滑。精瘀者

先理其離宮腐濁。古方用虎杖散。繼與補腎丸。六味精滑者乃用固攝秘元

絲煎。濁久而滑。則任督脉必傷。須升固奇經。青囊斑龍丸或鹿茸龜甲杞子核桃杜仲補骨

脂沙苑子茯神。大法挾寒者脉遲。革薺分清飲。挾熱者脉數。清心蓮子飲

濕痰流注者。蒼朮二陳湯。心經伏暑者。四苓散加香薷麥冬。小便如常

少頃澄濁在底。或如米泔色者。革薺分清飲。稠粘如膠。莖中滴痛者。腎

湯去桂附。積想心動。煩擾傷精者。加味清心飲。腎虛氣下陷者。補中

濁症治法。此外有溺血症。其原由於腎虛。無比山藥丸去巴戟從蓉加阿膠丹皮麥冬赤

苟非如血淋。因乎濕熱。但以痛不痛為辨。痛為血淋。不痛為溺血。也有白淫症。經言思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。發為筋痿。及為白淫。宜降心火。牛膝丸清心蓮子飲。又精傷白濁。小便推出髓條。痛不可忍者。乃由房事失節。宜便出髓條方。凡此皆精竅病也。

淋諸皆腎虛。膀胱生熱。故小水濇而不利也。治法初起宜清解結熱。

疏利水道。通川五淋散。加藕汁。不用補濇。淋而渴。屬上焦氣分。宜淡滲輕。

藥。如茯苓通草燈心瞿麥。清肺氣以滋水之上源。淋而不渴。屬

下焦血分。宜味厚陰品。如知藥滋腎丸。滋腎陰以泄水之下流。如肺燥

不能生水者。生脉散。心火及小腸熱者。導赤散。肺脾積熱移於膀

胱者。黃芩清肺散。腎水虧小便赤濇者。加減一沙淋。膀胱濇痛者。牛膝

湯加勞淋脾腎不足者。朝用補中益氣。血淋莖中熱痛者。炭秋

湯。秋石。勞淋脾腎不足者。湯。夕用六味丸。血淋莖中熱痛者。石泡

湯。溺瀉不痛者。一味琥珀末。薄氣淋臍下妨悶。木香。沉香。枳壳。

通。膏淋乃精溺並出。精塞溺隧。故小便瀉痛。初用海金沙散。若

不痛。須攝固其精。勿與通利。宜鹿角霜。兔絲子。蓮鬚。山藥。芡

淋寒。客胞中。欲溺先發寒慄。腎氣丸。加鹿膠。沉香。熱淋溺赤如血而少。時

煩渴者。導赤散。伏暑成淋。六一散。虛者。生脉散。因怒致淋。宜青皮。山梔

因思慮成淋。歸脾湯。暑月汗多。津液不降。參澤。妊婦病淋。葵子

赤白。莖中熱痛。如火灼刀割。溺濁。或赤或白。赤傷血分。白傷氣分。

也。赤濁有溺。赤有血。赤其純見鮮血。當從溺血條治。法見前論。若溺

色黃赤。固多火症。然必赤而痛。瀉兼見火脉。方可清利。若勞倦

傷中氣。酒色傷腎陰。溺短久而無痛瀉等症。則係水虧液涸。不可清利。經所謂中氣不足。溲溺爲之變。但滋補下元。氣化則水自清。加減六味丸。鹿茸地黃丸。白濁有濁在溺者。白如泔漿。此濕熱內生。有濁在精者。由相火妄動。精離其位。不能閉藏。與溺並出。或移熱膀胱。溺孔瀉痛。皆白濁之因於熱也。久之則有脾氣下陷。土不制濕。而水道不清者。有相火已殺。心腎不交。精滑不固。而遺濁不止者。皆白濁之因於虛也。熱者當辨心腎而清之。虛者當求脾腎而固之。舉之。

濁如泔爲胃中濕熱下流。二陳湯加草薢。黃蘗澤泄薑汁。精濁如膏乃精溺並出。瀉痛甚者先清火。抽薪飲。久則瀉痛去。精濁未止。宜固攝。固陰煎。元免丹。

○胃中濕熱濁痰下滲膀胱為溺濁與腎無干。若牽○肥人多白

膩如膏。心動即遺或溺後遺出皆精病與濁無干。○瘦人多赤濁係肝火○龍胆瀉○心虛遺濁者○金

濁係濕痰。○二朮二○陳湯。○玉關脾虛下陷者○補中益○心脾兩虛者○煎○兔絲○虛寒帶濁者○五味

丸。○淋瀝濕濁者○威喜○濁久足膝痿弱漩腳澄下如糊者○六味丸加○草薢麥冬

莖中大痛溺赤脉滑數宜清熱利水。○生地麥冬山梔○知母加六一散○腎虛淫火

易動精滑粘膩如膏。○九龍丹○若忍精不洩而成白濁者○四苓丹

方治白濁。○杞子錢半兔絲子車前子韭子各一錢蓮子廿粒其

三次。○人猪尿脬內煮加葱酒燉汁并食猪脬蓮子連服二

次。○赤濁者○猪苓○並加○麝香○杜○以通瘀腐之在隧竅者有溺時

結塊阻竅作痛塊中蓄水泡者必醉酒使內酒濕乘虛襲入精

竅也。○治同上

淋症脉候

少陰脉數。婦人則陰中生瘡。男子則氣淋盛大而實者生。虛小而瀉者死。

濁症脉候

赤白濁脉大而瀉。按之無力。或微細。或沈緊而瀉。為虛動滑為實。尺脉虛浮急疾者。皆難治。遲者易痊。

附方

石淋 神聖琥珀散 琥珀 桂心 滑石 大黃 膩粉 磁石

石淋 如聖散 馬蘭花 白茅根 甜葶藶 車前子 麥冬 檀

石淋 加味葵子散 葵子 三兩 茯苓 滑石 各一兩 芒硝 半兩

石淋 肉桂 各二錢 半 為散服方寸七

二神散

海金沙七錢五分 滑石五錢 爲末每二錢入蜜少許 以木通 麥冬 車前子煎湯下

補中益氣湯

見一卷中風

歸脾丸

見二卷勞瘵

生地黃丸

生地 黃耆各一兩半 防風 鹿茸 茯苓 遠志 栝婁仁 黃芩各一兩 人參一兩二錢

五分

當歸五錢 赤芍 蒲黃 戎鹽各七錢五分 炙甘草七錢 車前子 滑石各二兩 蜜丸

腎氣丸

見二卷虛損

雞蘇散

雞蘇 木通各二兩 生地 滑石各三兩 每服五錢 竹葉煎服

四物湯

地芍 歸芍

六味丸

見一卷中風

八珍湯

見一卷中風

勞淋 血淋 血淋 血淋 血淋 血淋

沙淋 中補 脾補 勞淋

大分清飲 見四卷泄瀉

琥珀散
琥珀末二錢
車前根葉
燈心
薄荷
等分爲

柿蒂湯 黃蘗 黃連 生地 丹皮 白芍 側柏葉 木

沈香散 沈香 石葦去毛 滑石 當歸 瞿麥各五錢
赤芍 冬葵子 白朮各七錢半 炙草二錢半

王不留行五錢 爲末每服二錢
大麥心湯下

瞿麥湯 瞿麥穗 木通 大黃 黃連 桔梗 當歸 延胡 枳壳 羌活 肉桂 射干 犬腹皮 牽牛

海金砂散 金砂 滑石各一兩 甘草二錢半 每服二錢
燈心湯下

鹿角霜丸 鹿角霜 茯苓 秋石 等分糊丸每服二錢

兔絲子丸 兔絲子酒蒸
蜜丸米飲下

桑螵蛸炙各五錢

澤瀉二錢半

林濁

淋膏

大沈香散

沈香 白皮

陳皮 莊子炒

黃耆各七錢半 滑石各一兩

瞿麥三兩 黃芩 炙草各

榆

五錢

為末每服 二錢 米飲下

聚精丸

黃魚鱔膠一觔切碎蛤粉炒 乳浸隔湯煮一炷香 搗丸

沙苑蒺藜八兩

馬

固精冷淋

肉蓯蓉丸

蓯蓉酒蒸焙 桂 檳榔各五錢

熟地 附子

山藥 石斛

牛膝

黃耆各一兩

黃連 官

心火熱淋

導赤散

見一卷溫

八味丸

見一卷中風

濕熱產淋

滲濕湯

見一卷中風

白茅湯

白茅根五錢 人參各一錢二分半

瞿麥

茯苓各一錢半

蒲黃 桃膠

冬葵子

滑石各七分

甘草五分

紫貝煨二个

江魚牙煨四个

薑三片 燈心二十莖

煎服

胞痺 胞痺 濕濁 熱濁 赤濁 赤濁 精滑 心脾

腎著湯

見一卷濕

腎瀝湯

麥冬 五加皮 犀角各錢半 赤芍 桔梗 桑

苓朮二陳煎

猪苓 茯苓 澤瀉各一錢半 白朮 半夏 各二錢 陳皮一錢 炙草八分

徒薪飲

陳皮八分 丹皮各一錢半 黃芩二錢 麥冬 白芍 黃蘗 茯苓

遠志丸

遠志八兩 茯神 益智子各二兩 研末酒煮 麴糊丸 棗湯下

加味清心飲

茯苓 石蓮各錢半 益智 麥冬 人參 遠志 石菖蒲 白朮 澤泄 甘草 車前

子各一錢 燈心二十莖煎服 有熱加薄荷

虎杖散

虎杖三兩 古方用虎杖草汁今世不識代以杜牛 膝 加麝香一分燉服

秘元煎

見四卷三消

兔絲煎

人參 山藥各二錢 當歸 棗仁 茯苓各錢半 兔絲子四錢 遠志四分 炙草一錢 鹿角霜二

錢

任督

青囊斑龍丸

鹿角膠 鹿角霜

熟地

兔絲子

柏子仁

寒挾

草薢分清飲

益智仁 草薢

石菖蒲

烏藥各一錢

加

鹽一捻煎服

寒挾

內補鹿茸丸

鹿茸

刺蒺藜

沙苑疾藜

肉蓯蓉

兔絲

炙

黃耆

製附子

紫苑

蜜丸

心火

清心蓮子飲

見一卷火

莖痛

二苓清利飲

二苓

二冬

地

草

苓

蘗

牡蠣

澤

濕痰

蒼朮二陳煎

二陳湯加

蒼朮

暑濁

四苓散

見一卷溫

思傷

瑞蓮丸

茯苓

石蓮炒

遠志

當歸

天冬

麥冬

柏子仁

溺血白淫髓條熱淋血分肺燥肺熱腎虧沙淋

乳香半兩
爲末蜜丸

無比山藥丸
見六卷腰痛

半苓丸
半夏 茯苓

便出髓條方
棗仁 參 苓 朮 茴香 補骨脂 益智

五淋散
茵陳 竹葉各一錢 赤芍 赤茯苓各二錢 木通 滑石 甘草各一錢

知藥滋腎丸
見一卷火

生脉散
見一卷暑

黃苓清肺飲
見一卷火

一陰煎
見二卷咳嗽

牛膝湯
杜牛膝 水煎加麝香

淋 渴 姪 淋 補 攝

參澤湯 四苓散加人參 或再加甘草

葵子湯 冬葵子 桑白皮 木通 赤苓 瞿麥各一錢 黃芩 白芍 枳實 車前子各五分 薑五片

加減六味丸 地 苓 丹 黃 山藥 蓮鬚 芡實 兔 絲子各二兩 龍骨 牡蠣 澤泄各一兩

五味子五錢 蜜丸

鹿茸地黃丸 熟地五兩 山黃酒炒 山藥炒各三兩 鹿 茸一具酥炙 龍骨煨一兩半 蜜丸

二陳湯 苓 夏 陳 草

抽薪飲 見四卷痢

固陰煎 見二卷脫

元兔丹 兔絲子十兩酒炒 五味七兩酒浸 茯苓 蓮肉 各三兩 為末 另研山藥末六兩酒煮糊丸

米飲 下

補 攝 滲 濕 清 火 固 精 攝 腎

濕痰肝火心虛虛寒濕熱清熱攝腎赤濁治濁

二朮二陳湯 見二卷痰飲

龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

金鎖玉關丸 芡實 蓮子 蓮鬚 藕節 茯苓 茯神
山藥 等分爲末 金櫻子熬膏杵丸

五子丸 兔絲子 韭菜子 益智子 茴香炒 蛇床子去
皮炒 等分爲末酒糊丸

威喜丸 茯苓 猪苓 黃蠟

六一散 見一卷溫

九龍丹 見二卷虛損

猪苓湯 猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉

丹方 杞子錢半 兔絲子 韭菜子各一錢 車前子五分
蓮子二十粒 入猪尿脬內煮加葱酒吸汁并食猪脬

蓮子 連服
二三次効

淋濁

丁 血淋溺痛左寸脉洪數此心移熱於小腸搏於血脉入於胞中與溲俱下因瘀熱迫注溺竅并莖中亦痛也當先清利火腑用導赤散加赤苓丹皮麥冬歸尾燈心木通一劑淋痛減後用生地茯苓歸身丹參遠志丹皮側柏葉鮮藕數服尋愈

周 遊幕縣署淋症失調晡後寒熱如瘧醫誤以爲陰虛雜進補瀉病益劇又進散劑疑不敢服涕泣求診脉虛軟而浮用補中湯數服寒熱止淋亦漸瘳後用六味丸加減而愈

王二給役書館夜私出初便濁秘不言後乃不便自遺瘦怯不任起立常如欲溺狀或前欲溺而後亦不禁此濁久氣虛下陷也

或以瀉熱之劑與服病益劇予用升舉法佐以利濕升麻茯苓
猪苓白朮半夏炙草蓮鬚蓮子做治濁固本丸意滑泄自止

貢 淋症愈而忽發色蒼形瘦食減便澹咽乾膝痛脉沈濡左寸

稍大是心熱移於小腸而與濕相搏參草薢分清飲赤苓生薏

米各三錢生白朮澤泄各八分石斛麥冬各二錢防已甘草各一錢革薢

通草各錢半滑石飛三分數服淋愈但脉來沈小食少足酸乃脾陽

腎陰素虧宜兼調爲治熟地杞子益智仁煨茯神甘草炙薏米

山藥蓮子俱炒歸身同研末加粳米屑調服日二次食進而足亦

健步

岳 勞淋是膀胱氣分病近日大便秘結食頃必脹足脛冷診脉

弦而遲乃陰結胃氣不主下行而膀胱之轉輸不利乃爲淋也
治宜溫通勿進止瀉川附生朮縮砂壳陳皮白韭子萆仁蘇子
俱炒研茯苓海金沙四服逆氣平脹秘良已脉亦和去川附萆仁
加牛膝蒸蓮子服愈

江 溺前瀉痛莖端宿有瘀腐向服瞿麥湯痛減導火下行故也
然脉來洪實搏指不特膀胱瘀熱未盡抑且心腎根源未清故
痛減淋不減也宜收心節慾勿擾腎臟戒酒薄味靜養可安茯
苓生地石斛葶藶蓮鬚甘草梢燈心澤泄數服而效

王 便濁而數且痛午後寒熱不時頭眩神倦脉弱自秋延春兼
溺血點乃勞力傷陰陰火迫注膀胱先用分利法導赤散加赤

蒼蓮鬚歸尾赤芍丹皮梔子燈草二服眩痛止去木通竹葉改熟地歸身又加革薢三服諸症俱瘳又令服六味丸愈

族某勞淋初用分清飲瀉痛已減後服單方通利太過反致溺後精懸腰足痠軟畏冷左脉虛澁少神腎氣不攝乃成虛滑攝固爲宜沙苑子兔絲子杞子蓮子破故紙熟地砂仁末炒杜仲數服而效後加鹿膠潞參歸身茯苓山藥乃固

睦 勞力傷陰脉右弦左大腹痛溺瀉出粉此爲沙淋海金沙分六

杜牛膝錢一當歸尾分八薏仁錢三燈心分八赤苓錢二小茴香鹽水炒數

服瀉痛止去前三味加杞子沙苑子益智子俱炒釵斛懷牛膝酒蒸

數服甚適此溫通之劑能節勞則淋可不發

族某膏淋溺面浮油有時便中推出髓條此積勞損傷腎陰所致
宿恙經年近又兼病陰瘡真元日憊飲食無味益腎必先補脾
舘參茯神山藥生白朮薏仁杜仲芡實蓮子俱炒何首烏沙苑子
十數服全愈

陳 色蒼體長木火之質陰分易虧五旬外納寵急圖似續月前

因濁成淋溺數而欠著枕仍然遺泄延至血水滴瀝而痛是爲
血淋精室旣傷心火猶熾診兩尺左弦右數宜腰膝痠軟足心
如烙也夫不痛爲溺血痛爲血淋雖腎虛挾火然導赤分清如
方鑿圓柄五苓入正亦抱薪救焚急用生料六味作湯可濟然
眉熟地六錢生地三錢懷山藥炒二錢茯苓三錢丹皮澤泄各一錢生蓮子

不去心

蓮鬚麥冬

錢各一

五味子

分五

數服痛止

淋減湯丸

兼進而

安

遺泄論治

凡臟腑之精悉輸於腎而恒擾於火火動則腎之封藏不固心為

君火肝腎為相火君火一動相火隨之而夢泄焉其交則心之神

肝之魂所幻而接也經曰恐懼不解則傷精時自下又曰厥氣客於陰器則夢接內然有有夢而

泄者有無夢而自遺者昔人謂夢而後泄者相火之強為害不夢

自遺者心腎之傷為多且謂五臟有見症宜兼治終不如如有夢治

心無夢治腎為簡要也乃詳求所因則有心陽暗熾腎陰內燠者

宜涼心攝腎補心丹加減有腎精素虧相火易動者宜厚味填精熟地

杞子羊腎猪春髓介類潛陽龜甲牡蠣佐以養陰固攝山藥蓮子

青鹽五味子之類有龍相交熾陰精走泄者宜峻補真陰承制相火三才封

腎丸。大有用心過度。心不攝腎者。宜交心腎。遠志丸。佐有思慮積

補陰丸。勞鬱損脾氣者。宜舒養脾營。歸脾湯。亦有脾虛下陷者。宜補中益氣湯。有腎

虛不固者。五倍子二兩。茯苓四兩。丸服效。有積想不遂者。宜安神固氣。解鬱疏肝。

妙香散。吞。有精關久滑不夢而泄者。宜固攝止脫。桑螵蛸散。金鎖玉關丸。有

房勞過度。下元虛憊。寐則陽陷而精遺不禁者。宜升固八脉之氣。

固精丸。或六味湯加鹿茸。免綠五味。龍齒。菴蓉。有壯年久曠。精滿而溢者。宜清火安神。地生

知母。黃蘗。菖蒲。有陰虛不攝。濕熱下注而遺者。宜泄熱導濕。黃蘗。黃連。

遠志。茯神。蓮子。有因醇酒厚味。釀成脾胃濕熱。留伏陰中而為夢

泄者。宜清痰火。二陳湯加二朮升柴。有因經絡熱注。夜則脊心熱而遺者。猪

心飲。亦有鬼魅相感者。其狀不欲見人。獨言笑。時悲泣。脉乍大乍

小。亦有鬼魅相感者。其狀不欲見人。獨言笑。時悲泣。脉乍大乍

小或縣縣不知度數顏色不變。乃其候也。宜蘇合香丸。此其所因。不同為遺為泄亦異。皆當分別施治。大約陽虛者急補氣。鹿茸大。陰虛者急益精。大補陰丸。陽強者急瀉火而已。宜補陰瀉火湯。滋陰降火湯。

遺泄脉候

遺精白濁當驗於尺結扎動緊二症之的脉訣

附方

天王補心丹 見一卷火

三才封髓丹 天冬 熟地各二兩 人參二兩 黃蘗三兩 砂仁一兩半 炙草七錢半 麴糊丸 茯苓

酒煎 送下

火瀉 滋腎丸 見一卷火

固鎮精閉腎攝氣固神安提升脾養墜鎮心安火瀉

大補陰丸

見一卷火

遠志丸

見四卷癰

靈砂丹

見二卷喘

歸脾湯

見二卷勞瘵

補中益氣湯

見一卷中風

妙香散

見二卷衄

玉華白丹

鍾乳粉一兩
左牡蠣煅七錢

陽起石煅

糯米粉糊丸
白石脂煅各五錢

桑螵蛸散

人參
龜版
菴歸
茯神

遠志

萸蒲

桑螵蛸

龍骨

金鎖玉關丸

見本卷淋濁

固精丸

牡蠣
白石脂
兔絲子
茯苓

韭子

龍骨

五味

桑螵蛸

補腎導濕

六味丸

見一卷中風

秘精丸

白朮 四兩

山藥 蓮鬚

茯苓 茯苓

茯苓 茯苓

蓮子各二兩

黃蘗五錢

芡實 車

前子三兩

共研末

氣虛者加人參一兩

金櫻膏丸

十補丸

白芍 各二兩

遠志 各一兩

茯苓 山藥各一兩半

熟地三兩

山藥 杜仲

山藥 杜仲

歸 歸

續斷 各二兩

五味 龍骨

杜蠟各七錢五分

金櫻膏丸

二陳湯

芩 夏

陳 草

薑

猪苓丸

半夏 猪苓

猪苓

清心飲

參 歸

地 草

連 茯苓

茯苓

棗仁 遠志

遠志

蓮

蘇合香丸

見一卷中風

蘇合香丸

鹿茸大補湯

夏 苳蓉

杜仲各一錢

歸 參

朮 桂

附 苓

鹿茸

鹿茸

滋陰

各五分

甘草

大造丸

紫河車蒸搗一具
仲黃蘗各兩半

生地四兩
牛膝麥冬

龜版天冬
歸身各一兩二

錢五味五錢

米糊丸

補陰瀉火湯

地芎

歸

芎

朮草

知母

天冬

滋陰降火湯

四物湯加

知母

黃蘗

元參

陽強瀉火

遺泄

某無夢而遺腎心輒泄乃心腎失交症用茯神丸參六味人參熟地茯神遠志當歸山藥蓮鬚棗仁五味龍骨蓮實糊丸服數料全愈

吉 已巳同會試前數日同寓約觀梨園座中遺泄如注歸寓後寒熱欬嗽吐痰此陰虛兼外感也令服補中湯寒熱退但脈虛而沈細欲絕斷爲腎損難治粗畢塲事神愈疲乏勞熱喘促痰嗽食減乃脾肺虛而氣不歸源也必用人參乃定彼吝費一友贈高麗參二錢予謂代用效減自須全投書人參養榮湯去熟地與桂加茯神山藥蓮實彼又將高麗參二錢分作四服予哂

之服後喘熱減飲食頗加又兩服改用潞參而效更減矣

族某夢泄宿疴腰痛新兼脘痛脉弦細此傷精候也妙香散去黃耆麝辰砂加砂仁馬料豆炒服效

呂 少年未室每十日一夢泄積久疲乏面少神采素服滋陰斂
滯等藥不效改服鎮心安神等劑亦不效予謂肝腎脉虛非相
火爲害但精關久滑氣少固攝耳詢之果有時無夢亦泄遂重
用參耆佐以五味茯神山藥蓮子兔絲芡實杞子俱炒滑泄竟止
更用丸劑加魚鱉炒研而固

幼姪宵讀神勞卽夢泄夜熱易飢左關脉搏按丹溪云主閉藏者
腎司疏泄者肝二臟皆有相火而其系上屬於心心君火也感

物而動君火動則相火隨之雖不交會精亦暗流矣又認府謂
腎之陰虛則精不藏肝之陽強則氣不固故夢而精脫也先用
六味湯加減熟地山藥茯神丹皮遠志潞參麥冬芡實蓮心石
斛數服而效後加龍骨白芍五味煉蜜爲丸服愈。此補肝腎
參養心之劑君火安則神魂斂而龍雷不擾矣

劉

試場受驚心惕精走於下延爲怔忡悸恐心君虛不主令相

代其權乃至有夢無夢皆遺腰膝痠軟乏力診左寸沈數左關

尺沈細如絲右尺微弦此心營損極神不攝精宜補養心神固

納腎真

經言恍惚思慮則傷神神傷則恐懼流淫不止又云恐

懼不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下大抵恍惚

傷心恐懼傷腎心腎失交精關不固必精生神神攝精乃能却病

且情志之病尤在靜養善調

勿希速效潞參熟地茯神各三錢龍骨山藥各三錢棗仁遠志當歸

各錢半金櫻子錢一五味子柏子仁各六分蓮子十一粒一服甚適診左寸

綿綿不絕惟尺澤空精腑少藏耳若滋填精室旬日內漏卮勿

洩尺脉可起又夜半易飢便滑前方去當歸柏子仁熟地山藥

焙用加魚鱉三錢兔絲餅二十錢服神安精固惟骨節時酸脇肉時

闊坐卧恍惚如在波浪中此病後神未復元虛陽浮越也宜招

集散亡封固管鑰更用潛陽填髓丸熟地八兩湖蓮芡實俱炒線膠

淡萊茯神山藥各四兩五味一兩龜板遠志麥冬硃砂拌炒猪脊髓

熬爲丸又經云精不足補之以味午用猪心腎海參煨食晨用

牛乳同糯米煮食調理數月漸安

陽痿論治

丸冷

莖縮

莖縱

強中

下疳附

男子二八而精通。八八而精絕。陽密則固。精旺則強。傷於內則不起。故陽之痿。多由色慾竭精。或思慮勞神。或恐懼傷腎。或先天稟弱。或後天食少。亦有濕熱下注。宗筋弛縱。而致陽痿者。蓋前陰為肝脉督脉之所經。經云。足厥陰之脉。入毛際。過陰器。抵小腹。又督脉起少腹以下骨中央。入繫。女子廷孔。循陰器。男子循莖。又為宗筋之所會。景岳云。陰陽總宗筋之會。會於氣街。下至纂。而陽明實氣血之化。故見症多。肝腎主病云。傷色慾者。須辨水源。陽明衰。則宗筋不振。故見症多。肝腎主病云。傷色慾者。須辨水衰火衰。水衰真陰虧乏。歸腎丸。還少丹。地黃湯。火衰精氣虛寒。右歸丸。八味參鹿茸。或加肉蓯蓉。杞子。若火衰不甚。斷喪太過。補骨脂丸。傷思慮者。心脾鬱結。陽事不舉。歸脾湯。妙香散。鬱傷少陽生氣日索。加味逍遙散。傷恐懼者。膽虛精却。

大補元煎。加。先天精弱者。房後神疲。固陰煎。胃虛食少者。水穀不

充。精髓失旺。脾腎雙補丸。七。其濕熱傷及肝腎。致宗筋弛縱。為陽

痿者。如筋角近火。則軟。得寒則堅。宜滋陰八味丸。經謂腎欲堅。急

食苦以堅之也。然必脉症果係濕熱。方用苦堅。淡滲。若肝腎虛熱。

仍宜養肝滋腎。他黃湯。加龜板元。又有心腎失交。夢泄致痿。遠志

熟地。棗。勞傷筋骨。陽道痿弱。無比山藥丸。腎虛無子。精冷精滑。七

仁。白芍。美髯。通治陽事不起。如贊化血餘丹。鹿茸地。此治法大概也。若夫

元陽既傷。真精必損。必兼血肉溫潤之品。緩調之。如斑龍丸。聚精

之。純用剛熱燥瀦之劑。恐有偏勝之害。其審而裁之可耳。九。二至百補丸

冷。陰痿弱而兩丸冷。陰汗如水。溺有餘瀝。此肝經有溼。柴胡勝。腎

冷。陰痿弱而兩丸冷。陰汗如水。溺有餘瀝。此肝經有溼。柴胡勝。腎

滋陰 益陰 滋陰

脉强大。右尺尤盛。此相火盛而反痿。滋腎丸。有陰莖內縮。乃肝

之筋受寒。四逆湯。陰縱不收。肝之筋傷熱。小柴胡湯加又強中

症莖舉不衰。精流不止。或由肝火太强。或由金石性發。宜瀉火

解毒。用知母、石膏、元參、夏子、益奇疾方。治玉莖長硬不痿。精自

出。捏之脆。癢如針刺。用補骨脂、家韭子、各一兩。研玉莖潰爛。謂

之下疳。先用米泔水濕洗。用爐甘石、乳香、血竭、黃連、各一錢。輕粉五分。米片一分。研末搽。立效。

附方

歸腎丸 熟地八兩 山藥炒 黃肉 茯苓 當歸 杞子 杜仲鹽水炒 兔絲子酒浸炒 各四兩 蜜丸

還少丹 見一卷中風

六味丸 見一卷中風

益火

右歸丸

見二卷虛損

益腎

八味丸

見一卷中風

通補

補骨脂丸

補骨脂炒香 兩 沉香錢半

兔絲子酒蒸各四兩 蜜丸鹽湯下

核桃肉一

心脾

歸脾丸

見二卷勞瘵

調鬱

妙香散

見二卷飢

暢肝

加味逍遙散

見一卷火

真精

大補元煎

見一卷中風

攝腎

固陰煎

見二卷脫

攝腎

秘元煎

見四卷三消

脾腎

脾腎雙補丸

人參 巴戟

蓮子 砂仁

山藥 橘紅

山萸 肉蔻

五味 車前

兔絲子 補骨脂

雙補扶脾滋陰泄熱心安補腎益精 補陽

蜜丸

忌羊肉

七福飲

見三卷鬱

玉母桃

冬白朮泔浸炒 載肉甘草汁浸炒

熟地酒蒸杵

何首烏九蒸

巴

滋陰八味丸

六味丸加

知

藥俱鹽水炒各三兩

龍膽瀉肝湯

見三卷諸氣

遠志丸

見四卷癰

無比山藥丸

見六卷腰痛

大造固真丹

補骨脂 兩 核桃肉

杞子各六兩

山藥

兔絲子各四

人參

鹿茸各二兩

五味子

小茴香

各一兩半

熟地

十二兩

於朮六兩

紫河車一具

蜜丸酒下

七寶美髯丹

赤白何首烏

各一

觔黑豆

拌蒸

茯苓乳蒸

浸

通治 通治 精填 通治 補火 督脉 益精 真精

各半觔 故紙芝蔴拌炒四兩

蜜丸 鹽湯下 贊化血餘丹 血餘燉八兩 熟地八兩 杞子 當歸 鹿

荅 荜蓉 核桃肉 何首烏各四兩 巴戟 小茴香 茯

人參隨宜

鹿茸地黃丸 見本卷淋濁

三子丸 蛇床 五味 兔絲 蜜丸

青娥丸 見六卷腰痛

斑龍丸 見本卷淋濁

聚精丸 見本卷淋濁

斑龍一至百補丸 鹿角膠 黃精 杞子 熟地 兔絲餅

龍眼肉 以上熬成膏加煉蜜調入後藥末 牛膝 精實 參 耆 荅 地 黃 味 芡實 山藥 知母 共十味為

驅濕濕熱陰縮和解

末和前膏

并丸

柴胡勝溼湯

升柴
歸尾

羌
黃根
苓

防已

草
五味
黃蘗

水煎
龍膽草

滋腎丸

見一卷火

四逆湯

見一卷暑

小柴胡湯

見一卷溫

畜血論治

凡跌撲傷損及努力負重忿怒氣逆皆使瘀血停畜其症寒熱發黃胸脇小腹滿痛手不可近宜分上中下治之如吐衄停瘀屬上部必嗽水不欲嚥犀角地黃湯血結胸膈屬中部必燥渴譫語桃仁承氣湯少腹硬滿大便黑屬下部必發狂善忘抵當湯代三焦畜血必狂躁便實生地黃湯畜血初起胸腹痛香薷散從高墜下惡血留停腹脇痛不可忍復元活絡湯怒傷血滯沈香降氣散胸前血瘀生韭汁和挾血如見崇狀當歸活絡湯身寒熱發黃脈弦細而伏千金用大黃芒硝歸尾桃仁人參桂心為末酒服二方寸畜血下黑如漆最危必神脈不變方可治瘀血燥結玉燭頭而身體發黃以絹包生薑查擦之自退

焦三部下下部中部上

附方

犀角地黄湯

見一卷溫
藕汁紅花

或加當歸 桔梗 陳皮 甘草

桃仁承氣湯

見一卷疫

抵當湯

水蛭三十个熬
大黃酒浸三兩

虫蠱三十个炒 桃仁二十个

代抵當湯

見二卷血

生地黄湯

生地汁一升
葉一握 虫蠱二十个

乾漆炒五錢 生藕汁半升 藍

桃仁五錢

水煎

水蛭十个 大黃一兩

分二服

香壳散

香附炒三錢
赤芍蓬朮醋炒各一錢

枳壳炒二錢

青皮

陳皮

烏藥

炙草二分

生草三分

紅花五分

研末每服四錢

復元活血湯

見二卷血

怒傷見崇燥結

沈香降氣散 見三卷鬱

當歸活血湯 歸芍地 薑桂苓枳柴草

玉燭散 見六卷腹痛

溺血論治

溺血與血淋異。痛為血淋。山精竅不痛為溺血。出溺竅痛屬火盛。

不痛屬虛。然經云胞移熱於膀胱則癰溺血。膀胱者胞之室。惟房慾損腎。

熱注膀胱。腎與膀胱相表裏。故血隨溺山亦火所迫也。其脉洪數。法當滋

化源。六味飲加如肺腎陰虛口乾腰痠。六味丸合小腸火盛血滲

膀胱。導赤散。肝火脉洪不能藏血。龍膽草湯加法。膽火溺血頭痛眩暈。當歸

溺血日久腎液虛涸。六味阿膠飲。陰虛火炎一切溺血血淋。保陰煎。小溲

自利後瀝血點痛如血淋。小蘗飲。小水不利赤濁淋閉。大分清飲。通治溺

血。益母草搗汁一升。服效。槐花炒鬱金煨。治血淋。琥珀研細。以燈

二。脾虛不能攝血。久而滑脫。妙香散。去桔梗麝。加煨龍骨。益智仁。

附方

六味湯

見一卷中風

生脉散

見一卷暑

導赤散

見一卷溫

龍膽草湯

一味龍膽草煎服

當歸飲

當歸一錢

羚羊角

赤芍各二錢

生地

刺薊葉各

六味阿膠飲

六味湯

加阿膠

童便

保陰煎

見五卷瘰

小蘇飲子

薊梔

歸各一錢

地

藕節各錢半

滑石

大分清飲

見四卷泄瀉

化源陰虛小腸肝火膽火液潤虛火血淋淋閉

脾虛

妙香散

見一卷

便血論治 腸風 臟毒附

便血與痢血異。便血宿疾痢血新邪兼有膿雜與腸風臟毒尤別。便血火淫腸風風淫臟毒濕熱

淫兼積毒便血由腸胃火傷陰絡血與便下治分血之遠近虛實新久

不可概行涼血瀉血金匱以先便後血為遠血。黃土先血後便為

近血。赤小豆當歸湯其血色鮮稠為實熱迫注多醇酒厚味釀成。約營煎地榆丸

色稀淡為脾胃虛寒。歸芍異功散加炮薑色瘀晦為陽衰不攝因中寒食冷

氣滯血凝必腹痛嘔瀉。附子理中湯倍炮薑思傷心脾氣不統血或年衰病

久歸脾。惟初起血中伏火用桂圓肉包鴨彈子肉若未止用劉寄

松蘿茶一錢烏梅。久而氣陷血脫補中益氣湯血滑不止舉元煎下若

面色萎黃下元虛憊。加味六君湯下斷紅丸或十全大補湯去茯苓加防風其結陰便血脉

便血

必虛。瀉係厥陰肝血內結。陽失統運。滲入腸間。諸家謂陰寒內結。

非也。遵醫通補中益氣。宿有血症。因感濕熱。血下紫黑。乃濕毒腸。

辟。升陽益。凡便血及腸風服藥不效。山查。大便燥結。肛頭血出。熟。

一兩

蒸食。

腸風。血清色鮮。遠射四散如篩。風性疏也。經言久風入中。則為腸風。

飧泄。加減四物湯。加秦艽。腸風挾濕。下如豆汁。或瘀紫。升陽除。

湯。有熱加黃。若濕熱內蘊。下血腹滿。槐花。初起血熱。槐花。久則。

連當歸。甘草。厚樸。血滑不止。惜紅。脾脉浮緩。土虛風溼交乘。加味。

湯。十全。腸風兼瀉。米豆。

大補湯。血濁而色暗。係溼熱蘊毒。輕者猪臟丸。酒毒釀溼熱下血。聚金。

毒。

重者臟連丸。

酒毒釀溼熱下血。

聚金。

若肛門血射如線或點滴不止為痔血秦艽白朮炮去皂角枳實澤瀉加槐花生地黃
痔與痢血另詳本門。

附方

黃土湯丸附地芩草阿膠各錢半 灶心土如

赤小豆當歸湯赤小豆二升浸出芽晒乾 當歸三兩 研

約養煎生地赤芍黃芩地榆續斷 甘草 槐花

地榆丸見四卷痢 水煎

歸芍異功散參苓朮陳歸芍

歸脾湯見二卷勞瘵

補中益氣湯見一卷中風

遠血近血熱迫血痢脾虛心脾氣陷

氣陷

舉元煎

見三卷飲食

如兼滑脫加

烏梅

文蛤

血滑

玉關丸

白麴四兩炒

枯礬

文蛤各二兩醋炒

五味炒

脾虛

加味六君湯

六君見一卷中風

再加黃耆

柴胡

斷紅丸

側柏葉

續斷各三錢

鹿茸一具

阿膠為丸

下虛

十全大補湯

見一卷中風

腸癰

升陽益胃湯

炙耆錢半

參

草各一錢

朮

歸

陳

柴胡各三分

煎東

山查子散

查肉炒研

艾湯調下

血鮮者加山梔

槐花

去瘀

加減四物湯

地歸芎

側柏葉各八分

枳

剉

草

烏梅二個

薑三片

槐花各四分

地榆

條芩

防風各六分

胃風湯 見四卷泄瀉

升陽除溼防風湯 防風二錢 蒼朮廿浸蒸 白朮飯蒸

槐花散 槐花二錢 蒼朮 厚樸 陳皮 當歸 枳壳各一錢

槐花飲 生地三錢 當歸二錢 側柏葉炒 荊芥炒 槐花炒 川芎 枳壳各一錢 炙草五分 如血不

止加升麻 阿膠

厚樸丸 厚樸 生薑各四兩同炒 朮 麴 麥芽各炒一

惜紅煎 朮 草 荊 芍 味 山藥 地榆 續斷 烏

米豆散 馬料豆炒 粳米 陳倉米 粟米 鍋焦俱炒研

猪藏丸 用猪藏二尺洗淨入 槐花二兩 紫緊蒸搗焙乾

藏連丸 黃連一兩酒炒研 槐花二兩炒研 陳倉米三合

類證治裁

采之七

便血

四

酒毒痔血

聚金丸

黃芩研末

醋糊丸

防風各二兩

米飲下

黃連四兩半生半酒炒

秦艽白朮丸

秦艽

白朮

歸尾

桃仁各一兩

枳實

澤泄各五錢

地榆二錢

麴糊丸

便血

夏

便紅遇勞輒甚初服苦參子

俗名雅彈子

以龍眼肉裏開水送下

十粒效後屢試不驗予按東垣論脾爲生化之源心統諸經之血思慮煩勞致心脾不司統攝宜用歸脾丸或暫服加味歸脾湯其血自止如言而瘥

湯丸內俱去焦白朮

幼姪鼻衄便紅寒熱無汗食減神疲脉大而數此脾肺氣虛陰火乘絡致血從清濁道橫溢而出用補中益氣湯去升麻加山梔白芍一服五更大熱止曉微汗身凉次日寒熱除脉頓斂三服而病已

服姪壯歲便後漉血色鮮乃腸胃遠血症屬腸風用升降法荊芥

當歸俱醋炒白芍俱酒炒槐米俱酒炒黑山梔生地甘草炙側柏葉三服愈

張 辛苦傭作日夜便血數次由冬入夏未止陰絡已傷漸至食

減無味神色慘悴脈來沈細而數勢必寒熱延成損怯勉用攝

血佐以益脾以脾統血也倣駐車丸去黃連阿膠水化炮薑當歸土炒

白芍熟地甘草俱炒蓮子炒紅棗南燭子茯苓三服紅痢減寒

熱亦止口中和據述腹不痛但裏急必連便二次此屬氣虛不


攝皆用潞參炙蒼苓山藥地榆酒炒赤石脂便血遂止

何 童年便血面黃瘦能食此脾氣鬱而生火也用清理溼熱由

梔赤苓生白芍生薏仁石斛當歸補骨炭陳皮地榆數服效

朱 春正痢血一載未痊陰絡大傷秋間三瘧歷冬會川常山劫

劑未效面浮足腫食減神疲懔寒宵熱尿虛近數陰傷及陽延
成損怯矣今痢純紅日夜十數次卽培陽攝陰尙恐不及乃閱
所服方仍用製軍輩屢次通裏是欲竭其漏卮乎毋怪愈治愈
劇也用潞參茯苓山藥白朮炒白芍甘草炙黑荆芥醋炒烏梅阿
膠燬一服血減明日不甚怯寒矣又加減十數劑瘧痢漸瘳



二便不通論治

腎主五液。開竅於二陰。至前後不通。氣機閉塞。脹滿不食。氣逆喘

急。危候也。揆病所由。有因三焦熱結者。宜黃連、黃芩、山梔、礞石、金枳、實海、金砂、檳榔。有因

三焦溼滯者。宜薏苡、通草、厚樸、茯苓、蒼廣皮、澤泄、大腹皮。有因溼熱阻氣者。宜石膏、滑石、知母、萊菔子。

郁李仁、車前子、木通。有痰隔中脘。氣痺上焦者。二陳湯加木通、探吐。有肺氣不降者。麥冬、杏仁、通草、枳殼。

知母、母赤茯苓。有胃實燥結者。小承氣湯。大分。有小腸氣痺者。小溫中丸。

有火腑熱結者。有厥陰熱秘者。火腑用更衣丸。厥陰用龍薈丸。有腑陽不行者。玉壺丹。

丹半硫丸。熱藥多秘。惟硫黃性緩。有血液枯燥者。通幽湯。有氣虛

血熱者。人參固本丸。有陰囊腫脹。熱蘊便閉者。三白散。按經云。女子督脉

入繫廷孔。男子循莖下。至纂。所生病。不得前後。据此則二便不通。

又宜通奇絡。如桂心、川楝子、小茴香、附子、當歸、五靈脂、桃仁、麻仁等。熱蘊腹脹。或用川螺加鹽

帛繫臍下一寸。有因膀胱溺滿。支撐廻腸阻大便者。五苓散、加木通、車前、溺

行便自出。亦有先通大便。水道自利者。圓機活法在乎審症而施

治焉。

大便不通。有實秘、虛秘、熱秘、冷秘、風秘、氣秘。有陽結、陰結。仲景云：脈浮

數。能食不大便。為陽結。脈沈遲不能食。身重大便反鞭。為陰結。

東垣云：實秘、熱秘。即陽結也。宜散。虛秘、冷秘。即陰結也。宜溫。氣

燥。以杏仁、枳實行之。血燥。以桃仁通之。風燥。以麻仁利之。氣滯不通。

以郁李仁、皂角子潤之。氣壅便秘。以參歸麻仁開之。葉氏治腸痺必開降

肺胃。如杏仁、枯蘆、冬葵子、枇杷葉、鬱金、汁、紫菀、以降肺。半夏、花柳、竹茹、橘紅、枳實、汁、薑、汁、以和胃。即丹溪開

上竅以通下竅之微旨也。今卽其症分別言之。由胃實者。善飲

食。小水赤。七宣丸。由胃虛者。不能食。小便清利。厚樸湯。由熱秘者。面

赤。脉實數。脹悶欲得冷。四順清涼飲。由冷秘者。面白。脉沈遲。欲得

熱。正氣散。加官桂。枳壳。香。由風秘者。風搏肺臟。傳入大腸。潤腸

防風。皂角。或去。婦人風秘。大仁丸。由氣秘者。氣不升降。穀氣不行。

善噫。蘇子降氣湯。加枳壳。由肺氣不通。降失於傳送者。杏萸枳桔梔。由三

焦不和。胸膈痞滿者。搜風順氣丸。由大腸實者。腹滿便鞭。麻仁

由腎虛液少。便燥者。六味湯。去茯苓。由血熱便難者。當歸潤

風熱鬱滯者。疏風潤腸丸。由血燥兼氣秘者。潤麻丸。由血虛秘結者。益

潤腸丸。由津液枯涸者。苳蓉丸。由幽門不通者。通幽湯。由素有風病

而便秘者。皂角由病後氣血未復及老人津液衰少產後去血

多者。入珍湯倍當歸加旋蓉由久病氣虛下陷致便難者。補中

湯加杏。蘇子杏仁阿膠黑芝麻老人陽虛風秘者。牛疏老人氣秘。橘杏丸老人血秘。蘇

仁。蘇梗又有脾約症傷寒陽明症自汗出小便數津液內竭其脾

為約。用脾攻蕩為治然亦滋其陰血為穩。宜當歸潤如陰寒秘

結當用溫藥須畧加清潤以去結秘若病本虛寒標現躁熱亦

宜於通陽藥中稍佐苦寒以去躁熱躁止勿加如陰躁刻欲就

冷兩尺虛或沈細遲勿用寒劑。理中湯或不效川外導法。蜜煎

五分皂角燒灰研五。冷秘者蜜煎中加草烏。熱秘者猪膽汁又

分。和捻尖熱納肛中。頭末和捻如上有求通努力虛氣迫注肛門裏急後重氣逆嘔惡不堪通利不

堪升提。

宜人參和壳。

或用

川芎當歸煎湯入穢

桶乘熱坐熏之亦效。

風秘發寒熱何

生

首烏兩許

或用

固本丸

失血後

煩渴

便結

一味生地

煎服

血液

燥結

黃汁

煎服

煎加蜜服

或用

熬膏服

失血後

煩渴

便結

一味生地

煎服

血液

燥結

黃汁

煎服

熱地蒸熱每

服五錢效。

若輕用

硝黃利藥

則秘愈甚

不通

經云

膀胱者

州都之官

津液藏焉

氣化則能出矣

三焦者決

不通

經云

膀胱者

州都之官

津液藏焉

氣化則能出矣

三焦者決

不通

經云

膀胱者

州都之官

津液藏焉

氣化則能出矣

三焦者決

不通

經云

膀胱者

州都之官

津液藏焉

氣化則能出矣

三焦者決

不通

經云

膀胱者

州都之官

津液藏焉

氣化則能出矣

三焦者決

瀆之官

水道出焉

是知膀胱主藏溺

必待三焦氣化

乃能出水

也詳列所出

有肺燥不能生水者

用清潤法

生脈散加沙參

有

也詳列所出

有肺燥不能生水者

用清潤法

生脈散加沙參

也詳列所出

有肺燥不能生水者

用清潤法

生脈散加沙參

有

也詳列所出

有肺燥不能生水者

用清潤法

生脈散加沙參

有

也詳列所出

有肺燥不能生水者

用清潤法

生脈散加沙參

氣閉不能通調

水道以下輪者

用探吐法

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

以沈香木香陳皮枳

吐有氣虛下陷

升降不利者

用升舉法

補中益

氣湯

孕婦胎重壓胞

孕婦胎重壓胞

孕婦胎重壓胞

孕婦胎重壓胞

孕婦胎重壓胞

孕婦胎重壓胞

孕婦胎重壓胞

孕婦胎重壓胞

孕婦胎重壓胞

小水閉者

用補中

氣升則水降

如滴水之器

開其上則下自通

如滴水之器

開其上則下自通

開其上則下自通

開其上則下自通

開其上則下自通

開其上則下自通

開其上則下自通

開其上則下自通

開其上則下自通

矣有火鬱小腸

溺短而痛者

用清降法

導赤散

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

有溼壅三焦致

閉癰者用分消法。通草滑石蘆根有暑溼泄瀉氣不化水者用

化氣法。五苓散有溼勝而渴小水不利者用分利法。四苓散有溼熱

閉阻經府氣分致便不通者用宣通法。石膏杏仁厚樸防已大腹皮海金沙各六一散

由腎水燥熱致不利者用滋清法。知母黃蘗黃芩有陽亢陰衰孤

陽不化者用補陰抑陽法。化陰煎若火不甚亢但由水虧者用補

水法。大劑六味湯經言無陽則陰無以生無陰則陽無以化熱在下

焦而不渴服淡滲藥腹脹不通益甚者。滋腎丸其陰陽大虧氣不

化者。腎氣湯溺閉轉筋喘急欲死者。八味丸料大劑其血結而致

閉者。牛膝湯痰盛而致閉者。導痰火閉者散。七正氣虛溺不利者。獨

湯。少加通治小水不通法。用獨囊蒜頭數枚梔子三枚鹽少或

廣皮煎。許爛搗攤紙貼臍上良久即通。

用食鹽半斤炒諸藥不效者用白菊花根搗爛以生白又法用
川螺一个連壳搗如泥入麝香細研末
少許置臍上以蛤蚧合之以帛紮定效

大便不通脉候

脾脉沈數下連於尺

爲陽結

火脉沈細虛遲

爲陰結

右尺脉浮

爲風結

附方

二陳湯

見一卷中風

小承氣湯

見一卷溫

大分清飲

見四卷泄瀉

涼膈散

見一卷中風

小溫中丸

見三卷腫脹

痰氣胃實熱結火盛氣痺

火府

更衣丸

分硃砂五錢

蘆薈七錢

各研酒和丸每服一錢二

陰厥

龍薈丸

見一卷火

通陽

玉壺丹

硫黃八兩

配麻油八兩微火熬以桑条攪候鎔盡即傾入水去油面再鎔傾入豆腐內煮糯米粉爲丸

通陽

半硫丸

製半夏

硫黃

等分蒸餅

薑汁和丸

治老人

液燥

通幽湯

見一卷燥

熱虛

人參固本丸

見一卷中風

腫囊

三白散

白牽牛頭末一兩

桑白皮

白朮

木通

陳皮

利溺

五苓散

見一卷溫

胃實

七宣丸

大黃

木香

檳榔

訶子皮

桃仁

研末蜜丸

虛胃

厚樸湯

樸

陳

朮

草

枳實

半夏麴

薑

棗

秘熱

四順清涼飲

見一卷火

秘熱

潤腸丸

麻仁

羌活

大黃

歸尾

桃仁

蜜丸加

防

秘冷

正氣散

見一卷中風

秘冷

木香順氣散

木香

草薢

益智

蒼朮各三分

厚樸四

胡各五分

秘風

大蘇子降氣湯

麻仁

熟大黃各三錢

木香

枳壳

檳榔各

秘氣

蘇子降氣湯

見二卷失音

秘氣

搜風順氣丸

大黃

麻仁

郁李仁

山藥

山黃

車前

蜜丸

秘實

麻仁丸

見一卷燥

液虛血秘氣血血氣秘血虛津少津虛血血氣秘血虛

六味丸 見一卷中風

潤燥湯 見一卷燥

潤麻丸 麻仁 桃仁 生地 當歸 枳壳各一兩 蜜丸

益血潤腸丸 歸地 荊枳 麻仁 杏仁 薏蓉 蘇

薏蓉丸 薏蓉二兩 沈香一兩 麻仁汁糊丸 米飲下

五仁丸 桃仁 杏仁各一兩 柏子仁五錢 郁李仁 松

皂角丸 羌防 杏枳 陳芷 桑皮 檳榔 麻仁

八珍丸 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

橘杏丸 橘皮 杏仁 等分蜜丸

氣秘血秘血秘血傷寒虛寒清潤清降分利宣通陽亢

二仁丸 杏仁 麻仁 枳壳 訶子肉 等分蜜丸

蘇麻粥 蘇子 麻仁水浸研汁 和粳米煮粥

三仁粥 桃仁 松子仁 郁李仁 搗汁和粳米煮粥

脾約丸 酒蒸大黃 枳實 厚樸 芍藥 麻仁 杏仁

理中丸 見一卷中風

生脉散 見一卷暑

導赤散 見一卷溫

四苓散 見一卷暑

六一散 見一卷溫

化陰煎 二地 牛膝 猪苓 澤泄 黃蘗 知母 紫豆

龍膽草 車前 水煎 小便不通

陰陽氣化喘急血結痰盛火閉

滋腎丸

見一卷火

腎氣丸

見二卷虛損

八味丸

見一卷中風

牛膝湯

牛膝 桃仁

當歸

黃芩

水煎

導痰湯

見一卷中風

七正散

車前 赤苓

山梔 燈心

木通

瞿麥

升草梢

蘆

大便不通

朱 八旬公車抵都途次委頓決旬苦不得便脉洪大右尺虛子

謂大腸主液此陽明液乾熱秘象也宜潤腸丸因高年血液燥

熱倣東垣潤燥湯用生熟地黃麻仁桃仁當歸紅花蜜冲服效

房兄病後便秘脉虛於潤補劑中參升降法潞參熟地黃當歸升

麻杏仁服愈

熟地可加
倍兩許用

石氏老年風秘兼痔血腫痛脉洪而虛用滋燥養營湯加荆芥

醋炒

地榆

酒炒

胡麻升麻薤蓉

蒸

煉蜜爲丸服效

滋燥養營
湯見燥症

李氏腑失傳送脇痛腕脹便艱皆氣機阻窒爲患宜先導其腑氣

用杏仁蘇梗厚朴鬱金橘白郁李仁當歸四服痛脹止兼令服

牛乳便亦通潤後左脇攢痛得湯浴則止乃肝氣滯由臟及腑

用麩皮炒熨兼用延胡

酒炒

白芍

炒

當歸金橘皮煎湯降香木香

俱磨
汁服而平

族婦大便旬餘一行或勸服大黃艱秘益甚兩尺沈大此清氣陷
下也用補中益氣湯去柴胡白朮加桃杏二仁數服而復常

小便不通

鄧氏陰虛陽搏謂之崩崩久成漏衝任經虛可知據述五月間因悲思血下成塊以後紅白相間至仲冬後淋瀝未止服藥不效近又少腹重墜兩拘掣痛如束小便至夜點滴不通或以爲氣阻窒痛用茜草歸鬚桃仁等通絡不應又以爲血虛滑脫用蒲黃石脂石英等鎮攝淋痛更劇脉沈弦予謂此症乃漏久而膀胱氣陷也通絡則漏卮益滲鎮攝則胞門益墜法宜溫而升之固以攝之於理爲近用升麻六分兔絲餅各三錢赤苓各三錢延胡當歸俱炒各二錢阿膠棕灰各一錢半茴香補骨脂俱酒炒各一錢沙苑子二錢一服得溺而掣痛止數服淋漏俱除

閉癰遺溺論治

胞痺

閉者小便不通。癰者小便不利。遺溺者小便不禁。雖膀胱見症。實肝與督脉三焦主病也。經云膀胱之胞薄以濡。得酸則蹇。縮約而不通。水道不行。又云膀胱不利爲癰。不約爲遺溺。此但主膀胱言之也。夫膀胱僅主藏溺。主出溺者三焦之氣化耳。故經云三焦下膈。並太陽正脉入絡膀胱。約下焦。實則閉癰。虛則遺溺。又云肝脉過陰器。其病閉癰。又云女子督脉入繫廷孔。男子循莖下至纂。病不得前後。此閉癰遺溺所由兼責諸經也。分言之。閉癰爲實。遺溺爲虛。閉爲暴病。癰爲久病。閉則點滴難通。全資氣化。或疏通利竅。或用丹溪吐法以升提其氣。

諸溺閉治法已見小便不通論中。此特詳溺癰治法。癰爲滴瀝。

不爽。惟滋養真陰。清熱化氣。升提非所宜矣。仲景云。陰虛則小便難。經曰。陽入陰分。則膀胱熱而小便難。東垣云。小便不通。皆邪熱為病。治分在氣在血。以渴與不渴辨之。渴而不利。或黃或濇。熱在上焦。氣分也。宜清肺氣而滋水源。黃芩清肺飲。閉而不渴。熱在下焦。血分也。宜潤腎燥以導其流。滋腎丸。若服淡滲之味。則陽無以化。而陰愈閉窒矣。其陰虛血熱。渴而濇痛淋瀝者。導赤散。切。或大便水瀉。小便濇少。五苓散。若溼熱傳於下焦。水道不利。益元散。若氣機閉塞。升降不通。二陳湯。去半夏。加木通。滑石。柴胡。升麻。以提之。若右寸數大。肺燥不能生水。是氣化不及。州都生脉散。去五味。加紫苑。車前子。茯苓。左寸數大。心火盛。移熱於小腸。天冬。麥冬。犀角。或腎火衰。水不能化。金匱腎氣丸。或元氣下陷。宜升黃連。赤茯苓。白芍。

清降濁。補中益氣湯。或血瘀下焦。小便閉滯。代抵當湯。此治閉癰大概。

也。若遺溺一症。有睡中自遺者。有氣不攝而頻數不禁者。有氣脫

於上。則下焦不約而遺失不知者。睡中自遺。幼稚多有。俟其氣壯

乃固。或調補心腎自愈。冠氏桑螵蛸散。惟水泉不止。膀胱不藏。多是年衰。

氣弱。以氣為水母。水不能蓄。由氣不固攝也。宜參耆歸朮益智甚。

至氣脫而遺失不知。惟類中風症及大病後有之。宜獨參湯。大抵遺溺。

失禁。由肺腎膀胱氣虛。肺虛。補中益氣湯。腎虛。免絲子散。膀胱虛。固脬。

挾寒。家非。挾熱。白薇。滑脫。秘元丹。命火衰。右歸飲。治。水。必先治氣。

治腎。必先治肺。惟鞏隄丸一方。凡心肺肺腎之屬。皆宜有因恐懼輒

遺者。此心氣不足。下及肝腎而然。宜歸脾湯。或五君子煎。下元虧損。固精睡。

中自遺多屬下元虛冷。宜蟬蛭丸。然遺失不知必交通心腎。冠氏桑小

兒自遺多屬熱。沈氏關泉丸。間或因寒。關泉丸去山梔。老人不禁多虛

寒。大兔絲子丸加減。間亦有熱。草薢分清飲。節齋謂老人溺頻數者由膀胱血

少陽火偏旺宜滋腎中真陰補膀胱津液。六味丸加麥冬五味。戴氏云老人

溺多者由下元虛寒腎不攝水以致滲泄。宜八味丸生料鹿茸丸。其滴瀝不

禁者為真陽不固。宜固脬散若不效。晝甚為陽虛。補中益氣湯。夜甚為

陰虛。八味丸。脬氣不足溺頻晝甚者。縮泉丸。夜間溺多者。八味丸。溺頻

而少為熱宜滲之。四苓散加滑石甘草。頻數久而益甚者屬脾虛氣弱。補中益氣

湯加五味山藥。若溺瀉得補益甚者為膀胱熱結。宜山梔茯苓木通滑石甘草竹葉燈心。溺

瀉而莖中痛者屬肝腎溼熱。龍膽瀉肝湯。溺後餘瀝屬腎氣虛。扶兔丸加覆盆

于益。欬而遺溺。屬膀胱急。茯苓甘草湯不妊婦溺出不知。或由脾

熱。加味逍。或由脾肺氣虛。補中益。或由肝腎陰虛。六味。產後小便

不禁。或由脾損。固脾丸。入珍湯。補脾飲。俟飢時大劑飲之。令氣血

驟長。遲則難效。產育不順。致傷膀胱。或收生不謹。或由膀胱氣虛。

加味補中湯。此治遺溺大概也。

胞居膀胱之中。受氣化以藏溺。出溺者也。經曰。胞移熱於膀胱。蓋膀胱內別有胞。得

氣化而為溺。以出也。若氣痺不通。必由膏梁積熱於上。作強傷精於下。溼

熱乘虛結於胞中。故痺也。經曰。胞痺者。小腹膀胱按之內痛。若

沃以湯。溺於小便。上為清涕。蓋以膀胱既虛。不能上吸肺氣。肺

氣不清。不能下通水道。所以痺塞不利。得熱湯之助。則小便清。

濟微通其氣。循經蒸發。肺乃暫開。清涕亦得上洩矣。條其治法。

由膀胱傷溼。致痺而溺澀者。腎著湯。加葶藶。由實熱致痺而溺痛者。葵子

丸。由溼熱致痺而溺不利者。腎瀝湯。由虛寒致痺而溺閉者。巴戟丸。

其艱澀如淋。不痛者。非胞病。屬腎陰虛。六味丸。加肉蓯蓉。鹿茸。其老人精

氣已衰。猶不絕。慾小便。澀痛。少腹脹閉。牽引穀道者。腎氣丸。晝苦

溺澀。夜則遺溺者。屬腎氣大虧。地黃丸。其膀胱氣墜。溺道不爽者。

補中益氣湯。石頑有治胞痺案數則。醫者忽之。今特標為論焉。

附方

黃芩清肺飲 見一卷火

滋腎丸 見一卷火

氣分 血分

淋痛 導赤散 見一卷溫

化氣 五苓散 見一卷溫

溼熱 益元散 見一卷溫

痰氣 二陳湯 見一卷中風

肺燥 生脉散 見一卷暑

腎虛 腎氣丸 見二卷虛損

升清 補中益氣湯 見一卷中風

瘀閉 代抵當湯 見二卷血

遺溺 冠氏桑螵蛸散 見本卷遺泄

腎虛 兔絲子散 兔絲子 五味 茯苓 杜仲 牡蠣 雞肫皮

勝

固脬丸

茴香三兩 附子五錢

製兔絲子三兩 酒糊丸

戎鹽一錢

桑螵蛸炙五

寒

家韭子丸

家韭子炒六兩 鹿茸酥炙四兩

兔絲子 巴戟肉各兩半

從蓉 牛膝

杜仲 石斛 桂心 乾薑各一兩

白微散

白微

白斂

白芍

等分

秘元丹

龍骨煨三兩 靈砂二兩

砂仁一兩

訶子肉炮

壯蠟丸

壯蠟丸

壯蠟三兩煨研 益智仁煨研

赤石脂煨研各二

右歸飲

見二卷虛損

衰火

聖隄丸

熟地 兔絲子酒煮 附子 茯苓 韭子炒各一

五味 益智

南 爲末山藥糊丸

加人參尤妙

歸脾丸

見二卷勞瘵

脾心

肝腎精虛虛冷

五君子煎

參 苓 朮 草 炮薑

固精丸

見本卷遺泄

螵蛸丸

桑螵蛸炙三十个 煅牡蠣 赤石脂

鹿茸酥炙 炙黃耆各三兩 人參各二兩 爲末山藥糊丸

鹽湯下

兒遺

沈氏闕泉丸

益智仁 茯苓 白朮 白斂 黑山梔 白芍 此沈芊綠先生自製方自云用之

頗效

老人

大兔絲子丸

桂 附 兔絲子 鹿茸 石龍芮各一兩 地 萸 牛膝 茯苓 杜仲 菴蓉 巴戟

茴香

沈香 續斷 故紙各三兩 桑螵蛸 覆盆子

五味子各五錢

蜜丸

革解分清飲

見本卷淋濁

溼熱水

六味丸

見一卷中風

多弱

鹿茸丸

鹿茸酥炙 脂石斛

椒紅炒

桂心 附子

牡蠣 補骨

桑

螺蛳四錢

為末

酒糊丸酒下

禁失

固脬湯

桑螺蛳酒炒二錢 肉各三錢 當歸酒炒

黃耆酒炒五錢 茯神 益母子各二錢

沙苑子 黃

生白芍錢半 升麻五分 羊脬一个煎湯代水 此沈芊綠先生尊生全書自製產後胞損失禁方

再煎 與固脬

丸各別

縮泉丸

烏藥 益智仁煨 等分為末 鹽湯下 尤治小兒遺尿

酒煮山藥糊丸

四苓散

見一卷暑

龍膽瀉肝湯

見三卷諸氣

扶兔丸

製兔絲子五兩 酒糊丸 鹽湯或米湯下三五十九

扶苓甘草湯

扶苓 桂枝各二兩 甘草一兩

生薑三兩 為末

遺 欬 瀝 餘 痛 瀉 熱 滲 頻 晝

婦產後產婦

加味逍遙散

見一卷火

八珍湯

見一卷中風

補脾飲

生黃絲絹一尺剪碎 白牡丹根皮 白芨各一兩 為末水煮必絹爛如錫空心服不得作聲作聲即不效

效

腎著湯

見一卷溼

葵子丸

冬葵子 赤茯苓 猪苓 枳實 瞿麥 滑石 木通 黃芩 甘草 車前子各一錢 薑五片

腎瀝湯

見本卷淋濁

巴戟丸

巴戟一兩半 桑螵蛸 遠志 生地 山藥 附子 川斷 菰蓉各一兩 杜仲 石斛 鹿茸

龍骨

兔絲子 五味子

山萸

官桂各三錢 蜜丸

地黃飲子

見一卷中風

腎虧

--	--	--

癰遺

族女產後嗽熱小水失禁脉虛數無力由真元不固臨產艱難損傷胞脉所致宜攝固真元佐以甘溫退熱用潞參茯神杞子黃耆白芍五味子川貝石斛牡蠣煅研桑螵蛸炙炙草五服嗽熱減加遠志熟地兔絲餅十服前症漸瘥

族姑衰年病後失調遺溺不禁兩尺濡弱症由膀胱血虛溺孔不能約制水液用歸身白芍杞子沙苑子覆盆子杜仲炒核桃肉紅棗熟地炒煎服效後用補中益氣湯而固

轉胞交腸論治

水液自小腸沁入膀胱胞受氣化變溺以出。胞蓋居膀胱中主藏

溺者也。

東垣曰膀胱雖爲津液之腑至受盛津液則又有胞居膀胱之中故經曰胞移熱於膀胱若忍溺

入房或溺急疾走水道氣迫則胞系屈戾名曰轉胞其症臍下急

痛小水不通與尋常溺閉自異直指曰此症孕婦多有或忍溺入

房使小腸氣逆而不通大腸氣與之俱滯外水不得入膀胱內水

不得出膀胱淋瀝急數大便亦裏急頻併因而腹脹治用涼藥疏

利小腸仍與通泄大腸胞卽歸正小水自流丹溪曰妊婦轉胞疏

通無效因思胞爲胎壓展在一邊胞系了戾不通爾胎若舉起懸

在中央胞系得舒小水自行宜升舉其氣補中益氣湯或再以渣煎服

探吐或令孕婦卧棚上將榻側豎起則胎不壓而溺自通若臨盆之際胎壓膀胱小便不通者以手指托起其胎小水自出丹溪治一婦患此診之兩手似牆重取則弦此得之憂患瀆爲血少氣多弦爲有飲以參朮飲以指探吐少頃又與一服凡與八服而安後歷試皆驗或用參朮湯強忍房事致胞轉而閉者非沈香不治老人轉胞困篤欲死六味湯少年溺瀆蒲黃散驚憂暴怒氣乘膀胱致胞轉溺閉葱白湯交腸症由大小腸失於傳送致清濁混淆也或因病後因嗜酒大便前出小便後出丹溪治一婦嗜酒常痛飲忽糟粕出前竅溲尿出後竅六脉沈瀆用四物湯加海金沙木香檳榔桃仁木通服愈回春曰一婦病愈後前陰出尿先服五苓散二劑又用補中益氣湯而愈則此症惟婦人有之耳

氣虛 婦妊 婦妊 婦妊 老婦 人通 治清 利驚 憂補 血通 利

附方

補中益氣湯

見一卷中風

參朮飲

參

朮

服後探吐

草

夏

地

芍

歸

芍

薑

參朮湯

參

朮

陳

草

夏

芍

歸

服後探吐

六味地黃湯

見一卷中風

蒲黃散

蒲黃

滑石

等分爲末服三錢

雞蛋清調下

滑石散

寒水石二兩

冬葵子一合

滑石

血餘灰

車前子

木通各

葱白湯

陳皮三兩

冬葵子一兩

葱白三莖

水五升煎

四物湯

地


芍

歸

芍

五苓散

見一卷溫



脫肛論治 肛頭癢痛附

脫肛元氣陷下症也。惟氣虛不能禁固。故凡產後及久痢。用力多。

老人病衰。幼兒氣血不足。多有之。大劑補中益氣。入門曰肺主魄。

門肺熱則肛門閉。肺寒則肛門脫。必溫補肺氣。前湯加訶以肺與。

大腸相表裏也。如脾胃虛寒。瀉痢而滑脫者。胃關煎加脾虛下陷。

而脫者。補中益氣湯。肝腎陰虛而下陷者。補陰益虛中挾火。或熱赤腫。

痛。補中益氣湯。加產後脫肛。六物煎。加升麻。或仍用溫湯洗而收。

之有溼熱下墜疼痛脫肛者。抽薪飲。或腸風下血脫肛者。人參胃。

便秘努掙致脫者。人參固本兼痔而痛者。四物湯。加槐。

寒者。以則芥胡葱煎洗。以伏龍肝熱者。以撲硝白礬湯洗。以。

類證治裁 卷之七 脫肛 本

腫痛。以田螺去層人水片化水搽之。小兒脫肛。龍頭炙。肛頭癢。朴硝煎湯熏洗。

內經曰。下者舉之。徐之才曰。瀉可去脫。治脫肛之法也。古人多用

參耆歸朮川芎甘草升麻之類。以升之補之。或兼用烏梅五味之

屬以固之。瀉之外。仍用熏洗收瀉之藥。則無不愈矣。

肛頭癢痛。風溼火兼病也。大腸受溼。流注肛頭。則作癢。秦芃羌活湯。得風與

溼熱。則生蟲而癢。神應黑玉丹。扁蓄湯。若蟲蝕其肛。則上唇有

瘡。化蟹丸。大腸有火。則肛門作痛。七聖丸。秦甚。或便燥。腸頭努出。

下血。當歸郁李仁湯。

丹溪曰。凡醉飽入房。忍泄前陰之氣。歸於大腸。木乘火熱而侮燥。金故火就燥也。大便必秘。其疾甚者。必以苦寒瀉火。以辛溫。和血。

潤燥疏風止痛。是其治也。
宜秦艽白朮大黃湯
九當歸郁李仁湯。

附方

通治 補中益氣湯 見一卷中風

舉元煎 見三卷飲食

參朮芎歸湯 參升麻 朮芎 歸耆 草芎 苓 山藥

胃關煎 熟地三錢 山藥 扁豆 白朮各二錢 黑薑 炙草各一錢 吳萸五分

補陰益氣煎 參草 陳柴各一錢 熟地三錢 山藥 當歸各二錢 升麻五分

六物煎 熟地錢半 白芍 當歸 人參各一錢 川芎 升麻各五分 炙草八分

殿胞煎 當歸五錢 芎 桂 苓 草各一錢

抽薪飲 見四卷痢

淫熱腸風勞脫痔脫血熱血虛溼瘡 蟲癢

大分清飲 見四卷泄瀉

胃風湯 見四卷泄瀉

人參固本丸 見一卷中風

四物湯 地 芍 歸 芎

涼血清腸散 地 歸 芍 各錢半 芎 連 荆 防 芎

秦艽四物湯 四物湯加 秦艽 丹 防 柴 蘗

秦艽羌活湯 羌活 錢半 秦艽 黃耆 各一錢 防風 七分

細辛 各三分

神應黑玉丹 獨皮 四兩 猪懸蹄 廿五个 牛角 腮 三兩

根皮 一兩二錢 雷丸 脂麻 各一兩 乳香 麝香 各一

錢 酒糊丸

下蟲蝕火痛肛痛下血熱秘

篇蓄湯

扁蓄一握水煎

化驢丸

桃仁

槐子

陳艾各三錢

紅棗肉枳丸

七聖散

郁李仁一兩半

木香川芎各五錢

大黃製八錢

桂心

奏朮白朮丸

見本卷便血

當歸郁李仁湯

郁李仁

皂角仁各一錢

槐花米七分

五

分大黃製

麻仁

當歸尾

生地

蒼朮各五

三分

寬腸丸

黃連

枳壳

等分糊丸

米飲下五十九

痔漏 耳痔 鼻痔 腦漏 偷糞鼠瘡 跨馬瘡附

凡澤旁突起高阜爲峙。巖中突出瘰肉爲痔。故有眼痔、鼻痔、牙痔、等名。至肛邊腫痛發瘡。經謂醉飽入房。筋脉橫解。腸澼爲痔。又督脉生病。癰痔。言精氣脫泄。陰火流注篡間。兩陰之交。多患痔疾。然陰虛生熱。或服餌辛毒。如椒酒及固精等藥。蓋川椒燒酒最能發痔。或用熱藥固精不泄。毒氣流注。勢必至穿漏矣。大腸燥秘。及憂恐氣結。奔走勞動。致瘡孔生。管流膿。斯成漏矣。痔有七。肛外發露肉珠狀如鼠奶曰牡痔。卽外痔。肛內腫突膿潰卽散曰牝痔。肛邊痛癢。顆顆發癰。更衣輒出清血曰脉痔。腸內結核痛而登廁肛脫曰腸痔。因便血注不止曰血痔。憂思恐怒立見腫痛。大便艱難曰氣痔。皆內痔。飲酒發動瘡痛流血曰酒痔。其形有雞冠、

蓮花櫻桃胡桃雞心鼠奶之狀。久而生蟲。便前血射一縷。為痔瘻。

瘻即漏也。經云。陷脉為瘻。

近旁穿穴。中生脆管。流膿不止。即為漏。有串臂者。有

串腸者。有串陰者。有穢從瘡口出者。漏卮不塞。精血日枯。漸成損

怯難治。宜戒酒色。節勞茹淡。滋填精血。

如魚鱉熟地龜膠。鹿膠。猪脊髓之類。

立齋論

治痔焮痛便秘。宜清熱涼血。潤燥疏風。治漏宜養元氣。補陰精。大

便秘。宜潤燥養血。肛墜作痛。宜瀉火除溼。作癢。宜祛風勝溼。腫痛

溺瀝。宜瀉肝導溼。若疝與痔兼患。

六味地黃丸。補中益氣湯。並服。

按痔初起。腸頭

腫成塊者。大腸溼熱也。滲而清之。

如生地。槐米。黃芩。甲片。歸尾。茯苓。枳殼。澤泄等。

作痛者。

肺大腸風熱也。宜而散之。

如荊芥。元參。當歸。杏仁。乳香。木香。枳殼。銀花等。

大便秘結者。脾

腎燥火也。清以潤之。

滋燥養營湯。去防風。加麻仁。白蜜等。

潰膿者。熱勝血也。涼以和

之。秦艽白朮湯去朮。痛兼血者。陰虛有火也。滋而養之。四物湯加

烏梅地。痔血漏膿久不止者。元氣不固也。升而攝之。補中益氣湯

榆等。柴胡或暫。血痔諸藥不應黑以止之。石煤槐花空心

情者調其鬱。生。加枳壳廣皮。酒痔多因溼熱釀火者。解其毒。四物

湯。槐角丸加。不拘痔漏腸紅。連丸。以止其血。不論痔瘻蟲痔。通

金銀花甘草。以絕其蟲。腫痛用洗痔法。以魚腥草苦楝根馬齒莧

子。荊芥防風朴硝煎洗。次以木鼈。點痔法。以蝸牛膠熊膽

用大鹽頭火。枯痔法。一錢沙糖調服。久自枯落。敷痔法。用蠶繭

指甲填滿外川童髮纏。二經云。陷脉為癭。音漏。留連肉腠。言寒氣陷入

因瘡穿膿潰不已。初則淡紅微腫。或小核久則上面槁白。內已

黑腐淫蟲惡臭生焉。故治漏先須透膿。用追毒丸。再用閉管丸。如漏之四邊

有硬肉突起。閉管丸中加蠶繭二。此方治遍身諸漏皆效。治穿腸

漏。川水安息香搽之十日全消。水安息香出波斯國。以椰子

退管。川芎皮丸。去管兼能生肌。用聖祖御賜方。及倘管退漏眼未平。宜

肌大抵漏瘡孔中必有惡穢之物。先用洗藥。以露蜂房白芷苦參煎湯熏洗日三次。

嗣用透管管退。嗣用生肌。近日專門治漏用韭葉彎刀披開其孔。

量漏之淺深。撚入線藥爛管。續用。生肌散。敷平瘡口待愈。愈後仍須

滋填精血。兼戒房勞奔走。及辛熱動風諸發物。每見不守禁忌。創

愈復潰。或轉成怯症者有之。亟當慎也。

耳耳中生如羊奶。內服梔子清肝湯。外點硃砂一錢。輕粉雄黃各三錢。冰片五厘。水調和。點之效。

鼻中生山瘰肉。用甜瓜蒂、甘遂炒各四錢，枯礬五分，共研細淨。

點痔。日一次，即化臭水而愈。

腦中時流臭涕。用辛夷二錢，羌活、獨活、防風、藁本、細辛各五分。

愈。或用黃荊樹葉，搓塞鼻中，效。

偷糞生近肛門，潰膿後，極易穿漏。腫痛時，用屋上乾猫屎、金魚、同

鼠瘡，頭骨炙灰研，同酒服，亦效。

跨馬一名懸瘰，生肛門前陰根後，交界處初起如松子大，漸如蓮

子，後如桃李。用甘草梢四兩，水煎服，即愈。外用金錠一塊，同搗碎，水調敷，立

止。若肝經溼熱，用龍膽、瀉肝湯。已成膿者，用生黃耆、人參、川芎、當歸各

五分，一服痛止，再服，內潰，十服肉便生。

痔漏脉候

脉弦絕瀉者難治。滑大柔和者易治。

附方

六味丸 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

滋燥養營湯 見一卷燥

秦艽白朮湯 見本卷便血

四物湯 見一卷中風 再加 黃芩 黃連 名芩連四物

槲皮散 臭椿皮微炒 石榴皮 黃連 地榆 阿膠各一
兩 艾葉三錢炒 爲末 粥飲下二錢

歸脾湯 見二卷瘰癧

晚服 朝服 清火 通治 涼血 瀉血 調鬱

紅止

梅連丸 川連一兩酒浸研末 百草霜一兩 烏梅即川浸
四五十九 三日服效 共搗為丸桐子大 每空心服
十日即愈

水銀聚子膏 水銀一兩 紅棗肉二兩 共研不見星為度
捻如棗核薄綿裹納肛中 明日蟲出

蝸牛膏 蝸牛一個 冰片 麝香各少許 同研爛以磁器
盛次早以汁敷患處

熊膽膏 熊膽五分 梅片一分 二味研細以井花水調
雞翅掃痔上

田螺水 以大田螺將針挑開磨盡入 冰片 白蜜少許在
內少頃螺即化水 雞翎蘸水拂之定痛而愈

追毒丸 胡黃連薑汁炒一兩 刺猬皮炙切炒黃為末二兩
麝香二分 為細末以梗飯為丸如麻子大 每空

心服一錢

酒下

閉管丸 胡黃連淨末一兩 甲片麻油內養黃 石決明煨
槐花炒各五錢 為末煉蜜丸麻子大每服一錢空

心米飲下 早晚日服二次
漏深者服四十日愈

管退

獬皮丸 刺獬皮大者一張新瓦上炙脆為末 象牙一兩研末 青黛三錢 槐米一兩五錢 陳細茶五錢

菜豆粉一兩 飯丸每服

三錢 金銀花湯下

解毒

御賜方 夏枯草八兩 甘草節 連翹各四兩 為末 金銀花一觔煎濃汁泛丸 如龍眼大 每早晨鹽湯下 三錢 初起者半料愈年久者一料愈 此

聖祖 御賜方 犀角屑 象牙屑 乳香 沒藥各一兩 明太祖親驗方 犀角屑 象牙屑 乳香 沒藥各一兩 明

為丸 此以連翹 金銀花浸酒煮半日服丸 每服二十一

生肌膚 雞旦黃去白熬出油三錢 輕粉研細一錢 乳香 血竭 龍骨研細各五分 入油內和勻 日以雞

翎塗患孔內外 蓋膏藥 半月可以完口

透管方 脈油四兩安鍋內 以雞子四個女髮一握 蓋上 以醉為度 面慢火煎至油乾 其髮亦化 空心陳酒下 雞旦

管退

管自出

通治

槐角丸

槐角炒

黃芩

地榆


當歸

防風

枳殼炒

每服六十丸空心

米飲下極效
或加烏梅亦妙



痔漏

某

痔血延久不痊便後血色鮮紫雖似腸胃遠血然恐腸盡肛

頭舊損所滲沿便之一縷而來尾閭不禁滄海易枯無怪面色

萎悴也治用涼以潤之黑以止之固以攝之槐米炒柿餅煨烏

梅蒸側柏葉搗地榆炒百草霜熟地杵加煉蜜丸服效

爛 汁青

王

氣虛下陷痔墜腫痛兼脫肛膿血用補中益氣湯加槐米茯

苓外用牡蠣粉黃蘗麝香安紙上承以布托肛入數次效

某

便燥出血痔核腫痛參東垣潤燥通幽二湯用熟地生地桃

仁麻仁紅花當歸酒

潤

杏仁甘草枳殼蜜丸此入血分潤燥結服

效

諸蟲

氣化之生蟲也。木朽為蠹，草腐為螢，日氣蒸雨，變生螟螣。臟腑之
生蟲也。肥甘不節，生冷失宜，中脘氣虛，溼熱不運，諸慝乃生。如髮
癭、瘰癧、疥蟲、尸疰、狐惑、應聲之類。其候心膈腹痛，面色萎黃，沈默
嗜眠，食減羸瘦，唇有紅白點，嘔多青綠涎，或拊膺生米、茶葉、泥，此
在小兒為多。其痛時作時止，其脉忽大忽小，其腹有氣梗起往來。
痛定便能食者，是古分五臟蟲形。如心之蟲曰蛔，脾之蟲曰寸白，
爛杏肺之蟲如蠶，諸蟲皆能殺人。惟肺蟲蝕肺，令人癆瘵，至咯血聲嘶，最
為難治。又有三蟲。長蟲、赤蟲、蟻蟲。惟蟻蟲最能病人。治之必於月初蟲頭
向上，空腹先飲肉汁，令其聞香聚而求食。以遇下之，蟲下淨乃啜。

將止之。蟲性喜甜。得甘則動。得苦則止。得酸則輟。得辛則伏。如烏

連。藥之苦。梅。醋。古法治傷寒。虬厥。理中湯。加川椒。臟寒吐虬。及胃

之酸。椒。薑。之辣。烏梅。胃虛。虬上入局。理中安。諸蟲攻胸急痛。掃蟲

腑。欬。嘔。長蟲出。烏梅。胃虛。虬上入局。理中安。諸蟲攻胸急痛。掃蟲

蟲。嚙。心痛。貫心。則死。蕪荑。蟲痛。口流清涎。以烏梅。川椒。腹有蟲積。萬

九。去。蟲。痛。腹熱。化蟲。蟲痛。肢冷。集效。蟲積。堅久。脹痛。黃瘦。獵蟲。一

乾漆。蟲。痛。腹熱。化蟲。蟲痛。肢冷。集效。蟲積。堅久。脹痛。黃瘦。獵蟲。一

切。蟲。積。追。蟲。元氣實者。木香。檳。虛寒。蟲動。嘔瀉。成疳。溫。臟。脾。疳。蟲

積。肚。大。肌。消。齟。腐。生。瘡。六。味。肥。蟲。積。嗜。生。米。泥。為。蟲。疳。以。史。君。子

南。星。研。細。沙。蟲。血。積。久。成。膈。嘔。涎。秦。川。煎。肺。嗽。有。蟲。骨。蒸。成。癆。百

膏。尸。疰。傳。染。鱖。肝。丸。消。渴。蟲。耗。陰。液。苦。棟。根。白。皮。一。握。切。焙。加。麝

殺。寸。白。蟲。櫃。子。四。十。九。枚。沙。糖。水。煮。每。上。旬。腹。生。鼈。痕。白。馬。溺。飲

殺。寸。白。蟲。平。旦。空。心。服。七。枚。七。日。盡。蟲。化。水。腹。生。鼈。痕。之。鼈。化。水。

嘔吐蝦蟲

銅綠煎湯飲之遂絕

口發言腹應聲

烏藍汁飲或服雷丸湯

狐惑症狀類傷

寒起卧不安四肢沈重

蟲食其臟上唇生瘡為惑必聲啞宜桃仁湯或甘草瀉心湯蟲蝕其肛下唇生瘡為

狐必咽乾宜苦參湯洗

穀道微癢糞後蛆蟲宜調補脾胃四君歸脾溫臟

以雄黃銳散納穀道中

等湯或化蠟丸外用

大腸蟲出行坐不得

用鶴蝩灰五錢小腸溼

棟根白皮煎湯洗之

熱溺竅蟲出

導赤散加史君婦人陰蝕蟲癢用蛇床子煎湯洗拭

細渾身蝨出血內俱壞

飲鹽醋湯半月即安

陰毛生蝨

蝨有八腳生肝腎陰

虧內服六味地黃丸

筋肉化蟲如蟹走皮膚內作聲

急用雄黃雷

末摻猪肉上炙

凡治蟲勢驟急者行攻逐

如大黃黑丑乾漆去

熟食盡自愈

則調其脾胃勢緩者用制伏

如川連胡連烏梅苦參脾弱者兼運

脾胃滯者兼消滯脾胃氣強蟲乃不生尤宜審臟氣之虛實而治

之毋端恃攻下爲也。

諸蟲脉候

乍大乍小者蟲脉。巢氏曰。腹痛脉當沈弱。若反洪大者。蛇蟲也。凡蟲痛時作時止。或大癰不可忍。面色或青或黃或白。而唇則紅。

附方

攻下
遇仙丹 牽牛 檳榔 大黃 三稜 蓬莪朮 木香 共研末 用皂角子研碎煎濃湯 法渣煮 麩糊爲丸

丸以茶清下四十九

烏梅丸 見三卷嘔吐

理中湯 見一卷中風

安蛇散 見三卷嘔吐

虛胃

厥蛇

寒藏

攻胸

掃蠱煎

青皮 烏梅

雄黃

礞石

樞子肉

烏藥

吳茱萸

再煎

徐徐服之

見三卷積聚

蕪荑散

見三卷積聚

貫心蟲積

萬應丸

三稜 莪朮

乾漆 檳榔

陳皮

木香

麥芽

史君子

神麴

雷

砂仁

藜豆大

為末

米醋糊丸

化蟲丸

鶴虱 胡粉炒

苦楝根

不出土者炒

枯礬一錢

為末

水丸

檳榔各一兩

米飲

下

下

腹熱

集效丸

太黃炒

一兩五錢

鶴虱

檳榔

訶子皮

木香

蜜丸

烏梅湯

下

下

下

蟲厥

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

蟲積

獵蟲丸

蕪荑

雷丸

檳榔

桃仁

乾漆炒

雄黃

錫灰

為末

湯

下

下

者蟲

三

浸蒸餅杵丸菜豆大

每服六七分

積蟲

追蟲丸

黑丑取頭末

檳榔各八錢

雷丸醋炒

南木香

各二錢

為末用茵陳二兩

大皂角

苦楝根白

皮各一兩

共煎濃汁為丸如菜豆大

壯人服四錢弱人

小兒服錢半

於五更時以沙糖水吞下去惡毒蟲積二三

次以粥

補之

攻下

木香檳榔丸

檳榔炒

木香

鷓鴣炒

貫仲

錫灰

乾漆

糊丸麻子大

每服二十九

虛寒

溫藏丸

參

朮歸芍

枳實

吳黃泡

為末神麴糊丸

白湯

下或加

附子

六味肥兒丸

黃連

陳皮

川楝子炒

神麴

麥芽炒

米

脾疳

下飲

蟲肺

肺蟲

尸傳

應聲

狐惑

狐惑

外治

類證治裁

卷之七

諸蟲

三

秦川剪紅丸

雄黃另研

木香各五分

檳榔

三稜煨

一兩

大黃一兩五錢

買仲去毛

乾漆炒烟盡

陳皮各

為末

糊丸每服五十丸

百部膏

取百部肥實者酒浸竹刀刮去心皮同款冬

百合

等熬膏

殺蟲治嗽

癩肝丸

癩肝一具陰乾為末水服上錢日三次治鬼疰傳尸

鰻魚湯

鰻魚淡食治虛損骨蒸勞瘵尸蟲

雷丸湯

雷丸一味煎

桃仁湯

桃仁去皮尖炒

槐花米各三錢

生艾五錢

大

甘草瀉心湯

見三卷痞滿

雄黃銳散

見四卷痢

調養蟲蝕溼熱補腎

歸脾丸

見仁壽方脈

化鹽丸

見本卷脫肛

導赤散

見一卷溫

六味丸

見一卷中風

蟲

周 自幼糞後下小白蟲如蛆肛內微癢中年時發時止此得之
腸虛受風宿病再爲溼熱迫注遂至化膿延久未愈憶友人亦
於童年患此服攻逐殺蟲之劑罔效後有人令服人乳數月蟲
絕知徒商逐蟲無濟也因疏溫臟丸用四君子湯加歸芍薏蓮
川椒樞實史君子俱炮薑檳榔爲末神麴糊丸空心白湯下輒
效

類證治裁

卷之六

諸症

三

類證治裁卷之七終